쎄쎄500산은 1포당 비타민C 500mg 및 초산토코페롤과 비타민B2를 함유한 상큼한 레몬맛의 산제입니다. 비타민C는 항산화작용으로 세포손상억제 및 노화 예방에 도움을 주며, 기미 · 주근깨의 증상을 완화시켜 줍니다. **쎄쎄500산**은 1회용으로 포장되어 있어 언제 어디서나 간편하게 복용할 수 있습니다.

【원료약품의 분량】 1포 중

제피아스코르빈산(KPC) ····· 417mg
(아스코르브산으로서 400mg)
아스코르브산(KP) ····· 100mg
토코페롤아세테이트50%(KPC) ····· 60mg
(토코페롤아세테이트로서 30mg)
리보플라빈3배산(KPC) ····· 6mg
(리보플라빈으로서 2mg)
첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호

【성 상】 레몬맛이 나는 미황색~황갈색의 내용물이 든 산제이다

【작 용】

1. **쎄쎄500산**은 멜라닌의 합성과정을 차단시켜 주므로, 기미 · 주근깨의 증상을 완화시켜 줍니다.
2. **쎄쎄500산**은 뼈, 연골, 치아, 결체조직, 피부 등에 함유되어 조직세포의 결합에 관여하는 콜라겐의 합성을 도와주므로 혈관벽을 튼튼히 하고 비출혈(코피)과 잇몸출혈을 예방해 줍니다.
3. **쎄쎄500산**은 항산화제인 비타민C와 비타민E의 복합작용으로 세포손상을 일으키는 활성산소를 저해하여 활성산소로 인한 노화와 세포손상 예방에 도움을 줍니다.

【효능 • 효과】

-다음의 경우 비타민 C, B2, E의 보급.

• 육체피로 • 임신 · 수유기 • 노년기 • 병중 · 병후의 체력저하시
• 햇빛 · 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화 • 잇몸출혈 · 비출혈(코피) 예방

【용법 • 용량】

24개월이상~8세미만 : 1회 1/2포
8세이상 어린이 및 성인 : 1회 1포, 1일 2회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. **다음 환자에는 투여하지 말 것.**
   1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
   2) 3개월 미만의 영아(갓난아기)
2. **다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)**
   1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
   2) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
   3) 임부, 수유부
   4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF,Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. **부작용**
   1) 이 약 투여에 의하여 구토, 구역, 식욕부진, 복부팽만감, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
   2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
   3) 에스트로젠을 포함한 경구용(먹는) 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
   4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
4. **일반적 주의**
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
   2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여한다.
   3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
5. **임상검사치에의 영향**
   1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
   2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
6. **저장상의 주의사항**
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
   3) 오(잘못사용) · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

【포장단위】 자사포장단위

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질 • 변패 • 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※주의 : 산제가 기도로 들어가지 않도록 입에서 충분히 녹여 복용할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2012. 07. 06

Hanmi 한미약품(주)
(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 **변경된 내용**은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

일반의약품
Ver.00187007

Hanmi

의약품 분류번호	314
	비타민C및P제

비타민C의 보급, 기미 • 주근깨의 완화

쎄쎄500산

한미약품(주)