

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

전문의약품

분류번호:132



퀴노비드® 이용액

QUINOVID® Otic Solution

오픈록사신 (Ofloxacin)

퀴노비드이용액은 퀴놀론계 항균제인 Ofloxacin을 함유한 이과용 항균제제로서 중이염과 외이염의 주 요원인균인 포도구균속과 녹농균을 비롯한 그람양성균, 그람음성균에 대해 광범위한 항균효과를 나타내며, 이들 감염증에 우수한 치료효과를 나타냅니다. 또한 기존의 항균 이용액이 갖고 있던 이독성등의 부작용을 개선시켰으며 소아에도 안전하게 투여할 수 있는 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

오픈록사신(Ofloxacin)(유에스피).....3mg

첨가제(보존제)벤잘코늄염화물(Benzalkonium Chloride)(약전).....0.025mg

첨가제: 염화나트륨, 염산, 수산화나트륨, 주사용수

【성상】 미황색 내지 담황색의 등명한 액

【효능·효과】

포도상구균속, 연쇄상구균속, 프로테우스속, 녹농균, 인플루엔자균과 같은 이 약 감성균에 의한 다음 감염증: 중이염, 외이염

【용법·용량】

성인: 1회 6-10방울 1일 2회 점어합니다.

점어후 약 10분간 이목을 합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약 및 기타 퀴놀론계 약물에 과민증 및 그 병력이 있는 환자

2. 부작용

- 1) 과민증: 심혈관계 허탈, 의식소실, 혈관부종(후두, 인두, 얼굴), 기도 폐쇄, 호흡곤란, 두드러기, 가려움증 등이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.
- 2) 외이염인 경우: 가려움, 어지러움, 이통이 나타날 수 있습니다.
- 3) 외이염이외의 질환인 경우: 미각이상, 이통, 가려움, 자각이상, 발진, 어지러움, 자극감, 구역, 구토, 구갈, 두통, 이루, 이명, 발열이 나타날 수 있습니다.
- 4) 청각, 전정장애, 청력저하, 교교대중이 나타날 수 있습니다.

3. 일반적 주의

- 1) 내성균의 발현 등을 방지하기 위해 원칙적으로 감수성을 확인하고 질병의 치료상 필요한 최소한의 기간만 투여합니다.
- 2) 이 약의 사용시에는 4주간의 투여를 표준으로 하고, 그 후의 계속적인 투여에 대해서는 신중히 합니다.
- 3) 이 약의 장기 사용에 의해 진균 등 비감수성균의 과잉 성장을 초래할 수 있습니다. 중복 감염시 투여를 중지하고 다른 요법으로 대처하십시오.
- 4) 치료후에는 이부가 계속되거나 6개월 이내에 재발할 경우 진주종(cholesteatoma), 이물, 종양 같은 근원적 원인을 제거하는 다른 방법이 추천됩니다.
- 5) 이 약을 포함한 전신 퀴놀론계 약물은 1회 투여로도 과민반응이 나타날 수 있으므로 발진 등 알레르기 증상이 나타나면 투여를 중지하고 전문가에게 상의하십시오.
- 6) 중이염에 있어서 염증이 중이점막에 국한되어 있는 경우에 이 약 점이에 의한 국소적 치료를 적용합니다. 그러나 염증이 고실 주변에까지 미칠 경우에는 국소적 치료 이외에 경구제 등에 의한 치료를 검토하는 것이 바람직 합니다.
- 7) 의사의 처방을 받은 환자만 투여하십시오.
- 8) 개봉 후 1개월 이내에 사용하십시오.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부에게는 치료상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 수유부에게 투여시에는 수유를 중단하거나 이 약의 투여를 중지하십시오.

5. 소아에 대한 투여

1세 이하 영아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않습니다.

6. 적응상의 주의

- 1) 점이용으로만 사용합니다.
- 2) 사용시 약액의 온도가 낮으면 어지러움을 일으킬 수 있으므로 사용시에는 가능한 한 체온에 가까운 상태로 사용합니다.

7. 기타

경구투여한 경우 동물실험(어린강아지, 어린랫트)에서 관절 이상이 나타났다는 보고가 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 마개를 꼭 막아 보관하십시오.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.



【저장방법】 기밀용기, 실온(1°C-30°C)보관

【포장단위】 5밀리리터/병

【소비자 상담 창구】 제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.

TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2012. 07. 04)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '03. 03. 19

설명서 개정년월일 : '12. 07. 04

제품의 사용기한은 외부용기에 표기
P32175-10



제조·판매원

한림제약주식회사

공장: 경기도 용인시 처인구 영문로 2-27(유방동)

<http://www.hanlim.com>

