

타루펜 주

Tarupain Inj.

타루펜주사액은 Hydroxocobalamin 제제로 구미 각국에서 약효와 안전성이 입증된 신경통 치료제입니다. Hydroxocobalamin은 간에서 머물면서 인체의 독성물질인 Cyan화합물을 신속히 뇨로 배설시킴으로서 신경통, 신경염을 근본적으로 치료하여 주며 손상된 신경조직을 신속히 정상적으로 재생시켜 주고 특히 각종 수술후 투여할 경우 통증을 제거시켜 회복기간을 단축시켜 주는 제제입니다. 타루펜주사액은 다른 cobalamin 제제와는 달리 인체에 바로 작용하는 성분으로 제제화되었기때문에 약효가 신속하며 작용이 지속적이므로 1일 1회 사용으로 충분한 효과를 얻을 수 있습니다.

■성분·함량 1 앰플 (1mL) 중

주성분 : 히드록소코발라민(USP) 2.5mg
등장화제 : 염화나트륨(KP) 4.1mg
완충제 : 아세트산나트륨수화물(KP) 1.94mg
pH조정제 : 아세트산무수물(KP) 적량
용제 : 주사용수(KP) 적량

■성상 갈색 앰플내의 암적색액이 들어있는 주사제

■효능·효과 다음 질환에도 사용할 수 있습니다.

급성신경염, 다발성 신경염, 좌골신경통, 류마티양신경통, 경견완증후군, 척수근통, 견갑관 절주위염, 암 및 외상에 의한 신경통, 대상포진 및 편두통에 의한 신경통

■용법·용량 성인:히드록소코발라민으로서 1회 5000 μ g, 1일 1회 근육주사 또는 정맥주사합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■사용상 주의사항

- 1.경고 - 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
- 2.다음 환자에는 투여하지 마십시오. 1)비타민 B₁₂와 그 유사체에 과민증 환자
- 2)악성종양 환자(조직발육에 대한 비타민 B₁₂의 작용으로 세포의 증식속도가 증가하지만 그 위험도에 대한 자료는 확실하지 않습니다.)
- 3.다음 환자에는 신중히 투여하십시오. 비타민 B₁₂와 그 유사체의 투여후에 나타나는 면역성 과민증은 매우 드물게 치명적일 수 있으므로 토양성 알레르기(천식, 습진)를 나타내는 환자에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
- 4.부작용
 - 1)과민증:드물게 가려움증, 두드러기, 홍반, 일과성의 발진, 속 등이 일어날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
 - 2)피부:여드름이 생길 수 있습니다. 3)기타:요의 착색이 나타날 수 있습니다.
- 5.적용상의 주의 - 근육주사시 동통을 일으킬 수 있습니다.

경고 - 앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의하십시오.

■저장방법·사용기간 차광밀봉용기, 실온보관(1-30℃), 제조일로부터 36개월

■포장단위 자사기준 ■제조자 (주)휴온스 - 충북 제천시 바이오텔리로 100

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하에 제조된 K.G.M.파적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정일자:2014.01.06