

온가족이 먹는 활력 비타민제

비올씨정

Ball-C tab.

일반의약품
분류번호:316

복용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

쉽게 피로를 느끼고 모든 일에 싫증을 내는 스트레스, 건태강 등은 현대인들에게 흔히 나타나는 증상입니다. 특히 연속적이고 과다한 육체적·정신적 활동과 공해 등 유해한 환경에 의해 건강의 리듬을 잃기 쉽습니다. 이러한 상태에서 고갈되기 쉬운 중요 비타민들은 체외에서 음식을 통해 공급해 주어야 합니다. 그러나 정신적 스트레스 및 과다한 육체활동을 비롯하여 편식이 심한 경우나 성장기 어린이 등에는 식사만으로는 영양섭취가 충분하지 못한 경우가 많습니다. 따라서 우리 몸의 적절한 영양상태와 컨디션을 유지하기 위해서는 탄수화물, 지방, 단백질 등과 함께 인간의 정상적인 대사, 생식·성장 및 조직재생에 필수적이면서, 소량으로도 각기 특유한 생리기능을 갖는 혼합비타민제의 공급이 필요하게 됩니다.

비올씨정에 함유되어 있는 수용성 비타민류의 주된 약리작용은 보호소 또는 그 구성성분으로서 대사를 원활하게 하는 기능을 가지며 특히 육체피로, 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 눈의 피로, 잇몸출혈 예방, 구내염(입안염), 신경통, 근육통에 효과적입니다.

비올씨정은 필수 비타민B군과 다량의 비타민C를 함유하여 비타민 결핍증의 예방 및 건강 유지를 위해 사용되는 혼합비타민제입니다.

● 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

티아민질산염(KP)	15 mg
리보플라빈(KP)	10 mg
피리독신염(KP)	5 mg
시아노코발라민(KP)	5 µg
아스코르브산97%과립(별규)(아스코르브산으로서 600 mg)	618.6 mg
판토텐산칼슘(KP)	23.2 mg
니코틴산아미드(USP)	100 mg
청가제(타르색소) : 황색5호, 적색40호	

● 성상 : 연홍색의 장방형 필름코팅정

● 효능·효과

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 견통(어깨통증) 등), 구각염(입고리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기, 눈의 피로
- 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
- 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방
- 다음 경우의 비타민B₁, B₂, B₆, C의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하

● 용법·용량 : 8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1정, 1일 2회 (아침, 저녁)복용

● 사용상의 주의사항

1. 다음 환자는 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아(갓난아기)

2. 다음 환자는 신중히 복용하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 과산화노중환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임신부, 수유부
- 4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 부작용

- 1) 이 약 복용에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의 합니다.: 구역, 구토, 설사, 묽은 변
- 2) 장기간 고용량을 복용할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 3) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 4) 폴산이 부족한 환자가 비타민B₁₂를 1일 10µg 이상 복용한 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 5) 고용량 복용에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시킵니다.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.

5. 상호작용

이 약을 복용할 경우에는 레보도파와 함께 복용하지 않습니다.

6. 임상검사에 대한 영향

- 1) 각종 요검사에 혈액의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 두개를 꼭 닫아 보관합니다.
- 3) 오(잘못 사용)·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

● 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

● 포장단위 : 자사포장단위(외부포장에 표기)

● 제조자 : 경남제약(주) 충남 아산시 신항면 서부남로790번길 49

※ 기타 주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.

소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 "소비자분쟁 해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품서관 「http://drug.mfds.go.kr」 → 「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.



경남제약(주)
Kyung Nam Pharm.Co., Ltd.