

네오카틴 정

(아세틸-L-카르니틴염산염)

생활수준이 높아지고 의학이 발달함에 따라 인간의 수명은 점점 더 길어지게 되었습니다. 선진국과 마찬가지로 국내의 노인인구도 급격히 증가하게 됨에 따라 노인성 치매 및 혈관성 치매의 환자도 증가 일로에 있습니다. 치매는 많은 노인들이 겪고 있는 지적장애증상으로 대부분 기억장애를 비롯한 판단력장애 등 여러 가지 병적인 증세를 나타냅니다. 네오카틴정은 다음의 약리작용을 지닌 뇌기능 개선제로서 각종 임상시험연구결과 일차적 퇴행성질환(예:알츠하이머서치매)이나 뇌혈관질환(예:중풍)에 의한 이차적 퇴행성 질환에 효과가 있는 것으로 입증되었습니다.

【특징 및 약리작용】

1. 주성분인 아세틸-L-카르니틴은 체내생리물질로서 뛰어난 안전성과 유효성을 나타냅니다.
2. 혈액뇌관문(Blood Brain Barrier)을 쉽게 통과하여 대뇌의 혈류량 및 대뇌대사를 증가시켜줍니다.
3. 신경전달물질인 아세틸콜린의 생성을 촉진시켜 신경전달작용을 원활하게 하고 신경세포기능을 개선시킵니다.
4. 활성화된 아세틸그룹(Acetyl group)을 갖고 있어 신경성장인자(Nerve Growth Factor)수용체를 활성화시켜 신경세포의 영양성을 높여줍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

아세틸-L-카르니틴염산염(KP)

(아세틸-L-카르니틴염으로서 500mg)

590mg

【성 상】 백색의 장방형의 제피정

【효능·효과】 일차적 퇴행성 질환 또는 뇌혈관질환에 의한 이차적 퇴행성 질환

【용법·용량】 아세틸-L-카르니틴으로서 1회 500mg을 1일 2~3회 경구투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자
2. 이상반응
이 약의 복용 시 드물게 흥분작용이 나타나는 경우가 있으나 체내의 약용량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 소실된다.
3. 상호작용
다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있다.
4. 임부 및 수유부 등에 대한 투여
동물실험에서의 태아독성은 보고된 적이 없지만 임신 초기 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우에만 의사와 감독하에서 복용할 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60정

본 제품은 흡습성이 우려되므로 PTP포장 상태로 조제하여 주십시오.

- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)→「정보마당」→「의약품등 정보」를 참조하시기 바랍니다.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 대표전화 : 02-2672-1122, 제품문의 : 080-655-1414 홈페이지 : www.gujujup.co.kr
- * 제조자 : 구주제약(주) 경기도 화성시 정남면 덕절제길 5

설명서문안 최종 개정연월일 : 2015. 7. 13

I-1501

