

근육·신경 보강제 마그네스정

분류번호: 322
일반의약품

MAGNES Tab.

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며, 제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 락트산마그네슘수화물(EF).....470mg
피리독신염산염(KP).....5mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 디아세틸화노도글리세리드, 분말셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 친분글리콜산나트륨, 전호화전분, 텔크, 포비돈, 황색산화철, 히프로멜로오스프탈레이트

【성 상】 노란색 장방형 장용성 필름 코팅 정제

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 B6의 보급
-임신·수유기
-병중·병후의 체력저하 시
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】

- 마그네슘 결핍: 성인 1회 2정, 1일 3회, 식사 중 다량의 물과 함께 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
- 2) 만 12개월 미만의 저역아
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염 제제, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 3) 신장장애 환자
- 4) 저단백혈증 환자
- 5) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장 박동정지, 중추신경계 기능저하 가능성 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 2) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30도)보관

· 제품을 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래 용기에 넣어 보관할 것.

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 100정/병, 500정/병

* 본 제품은 '의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)'에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

* 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2020년 06월 24일) 이후 변경된 내용은 대한제약(주) 홈페이지나 고객센터전화(080-855-0114)으로 문의하시기 바랍니다.

* 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합 정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

* 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관(1644-6223)에 자발적인 부작용 보고 및 피해구제를 문의할 수 있습니다.

첨부문서 개정일 : 2020년 06월 24일



대한제약주식회사

서울특별시 서초구 남부순환로 2145
공장: 강원도 횡성군 횡성읍 한루로 495
<http://www.dhpharm.co.kr>