

혈액순환장애, 치매성 증상을 수반하는
기질성 뇌기능장애에...

KGMP 일반의약품
적격업체제품 분류번호 219

파누스에프 정

(은행엽엑스)

Parnus-F™ Tab.(Ginkgo biloba Ext.)

파누스에프 정은 은행잎으로부터 추출한 생약제제로서 혈관의 손상 방지 및 탄력유지, 혈액의 점도저하, 말초혈관확장, 뇌순환 개선작용으로 혈액순환을 원활히 함으로써 말초동맥순환장애, 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림) 등 말초순환장애증상과 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료에 사용할 수 있는 제제입니다.

■ 원료약품의 분량

1정 중
은행엽엑스(생규)..... 80.0mg
첨가제(타르색소) - 청색1호 알루미늄레이크,
황색203호 알루미늄레이크

■ 성 상 : 연녹색의 장방형 필름코팅정

■ 효능 · 효과

1. 주효능 · 효과
 - 1) 말초동맥순환장애(간헐성 파행증(이따금 질뚝거림))의 치료
 - 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
 - 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

■ 용법 · 용량

- 성인 —
- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽엑스로서 1회 40밀리그램 1일 3회 또는 1회 80밀리그램 1일 2회 경구 투여한다.
 - 2) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80밀리그램 1일 3회 또는 1회 120밀리그램 1일 2회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
2. 부작용
 - 1) 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
3. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에게는 투여하지 않는다.
4. 임부에 대한 투여

동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.

5. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의사항

직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 90, 180, 300정

※ 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 심한부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
4. PTP포장을 개봉하여 복용시 가끔 정제에 포장물이 같이 따라 오는 경우가 있으니 복용시 정제에 포장물이있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2015년 9월 3일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)또는 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

08016
PFT-03-12-1171

제조판매회
SAMJIN **삼진제약주식회사**

본 사 : 서울특별시 마포구 위안로 121 (서교동)
공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6