

보두레아크림(우레아)

일반의약품
분류번호: 266

Bodurea Cream

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

- 유효성분: 우레아 (KP) 200.0mg
- 첨가제(보존제): 벤질알코올 2.0mg
- 기타 첨가제: D-판테놀, 미네랄오일, 백색바셀린, 세탄올, 소르비탄스테아레이트, 스쿠알란, 스테아릴알코올, 정제수, 토코페롤아세테이트, 폴리소르베이트80, 프로필렌글리콜, 피로아황산나트륨

【성상】 흰색의 크림제

【효능·효과】

진행성 지각각피증(주부습진의 건조형), 손·발바닥각피증, 어린선(魚鱗癬), 노인성 건피증(피부건조증), 모공성 태선, 아토피피부

【용법·용량】

1일 1~수회(여러 차례) 환부(질환 부위)를 씻은 다음 이 약을 바른후 충분히 문지른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자(부위 또는 경우)에는 투여하지 말 것.

- 1) 안점막등의 점막
- 2) 이 약 성분에 과민증 환자
- 3) 급성 습진 또는 염증성 피부질환 환자
- 4) 신부전 환자에 광범위하게 적용하는 경우

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 염증, 균열(갈라짐)을 수반한 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있다)
- 2) 피부자극에 대한 감수성이 높아진 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있다)
- 3) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 자극증상: 통증, 열감 때때로 홍조, 가려움 등의 자극증상이 일시적으로 나타나거나 투여초기에 나타날 수 있다.
- 2) 과민증: 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 피부: 때때로 습진화, 피부의 균열(갈라짐), 구진, 따끔따끔한 느낌, 작열감(화끈감), 인설(비늘, 껍질), 드물게 부종(부기), 건조화가 나타날 수 있으며 이러한 증상이 심하게 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

4. 상호작용

이 약에 의해 코르티코이드, 디트리놀, 5-플루오로우라실과 같은 성분의 피부로의 흡수 및 침투력이 높아질 수 있다.

5. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 적용한다.
- 2) 궤양, 미란(긁힘), 상처 부위에는 직접 적용하지 않는다.
- 3) 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어낸다

6. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

【포장단위】 50g/튜브

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

■ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

■ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

■ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.

■ 기타 자세한 사항이나 문서의 작성(개정)일자(2017.06.30.) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-558-7575)로 문의하시기 바랍니다.

■ 부작용 보고 : 한국의약품 안전관리원 (1644-6223)