

- 원료약품 및 그 분량 1정 중
 건조수산화알루미늄겔(USP) 250mg
 (수산화알루미늄으로서 191.25mg)
 탄산마그네슘(KP) 160mg
 첨가제(동물유래) : 유당(젖당)수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

■ 성상 흰색의 원형 정제

- 효능 · 효과 위산과다, 속쓰림, 배가 거북함, 위부팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림

- 용법 · 용량 성인 : 1회 2정을 1일 3회 식후에 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음환자에는 투여하지 말 것

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 신장애(신장장애)환자
- 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자

3. 부작용

이 약을 투여 받고 있는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 장기연용(계속 복용(사용))을 하지 않는다.
- 2) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.




1000정

일반의약품

분류번호 : 234

알마트린 정

Almatrin Tab.



제조 · 판매원

성원애드코제약(주)

경기도 김포시 통진읍 가현로 182-4

<http://www.swpharm.com>

4) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의 한다.

5. 소아에 대한 투여

이 약은 7세 이하의 영아(젖먹이, 갓난아기), 유아에게 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

■ 포장단위 1000정

■ 저장방법 밀폐용기 실온(1~30℃) 보관

■ 사용(유효)기한 제조일로부터 36개월

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 반드시 설명서를 읽어주시기 바랍니다.

※ 제품문의 : 성원애드코제약(주) TEL. 02-3665-2872

■ 설명문안 개정일 2014. 06. 19

제 조 번 호 :

사용(유효)기한 :



8 806649 003813

