

[성 상] 백색의 구형과림이 들어 있는 상부 연분홍색, 하부 연회색의 경질 캡슐제

[저장방법] 기밀용기, 상온보관(15~25℃)

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 6캡슐

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입한 약국을 통해 교환하여 드립니다.

작성일자 : 2011. 05

제조사 : 한국맥네티(주)

판매자 : 광동제약(주)

경기도 화성시 동탄면 중리 713-2

경기도 평택시 모곡동 440-2



일반의약품 분류번호:141

콧물 코막힘 재채기

센티콜 캡슐

3종코팅방식으로 약효가 12시간 지속!



6캡슐
3일분



광동제약(주)

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(262.2mg) 중

주성분 : 세티리진염산염 (BP) 5mg

주성분 : 수도에페드린염산염 (KP) 120mg

첨가제(타르색소) : 적색3호, 황색4호, 청색1호

[효능·효과] 다음 증상을 수반하는 계절성 및 다년성 알레르기 비염(코염)의 완화 : 콧물, 코막힘 재채기 눈·코의 소양증

(가려움증) [용법·용량] 1 12세 이상의 소아와 성인 : 식사와 관계없이 1회 1캡슐씩 1일 2회(아침, 저녁) 복용한다. 이 약은 씹거나 부수어서 복용하지 말고 그대로 삼켜서 복용한다. 2. 이 약은 2~3주 이상 복용하지 않도록한다. 3. 신기는 저하 환자 및 간기능 저하 환자의 경우 감량(줄임)하여 1회 1캡슐씩 1일 1회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 이 약 또는 ephedrine 또는 piperazine류에 과민증이 있는 환자 2) 심각한 고혈압 또는 심각한 관상 동맥(심장동맥) 환자 3) Monoamine oxidase(MAO) 저해제(억제제)를 투여 받고 있는 환자 4) 안내(안구 내압이 증가되어 있거나 녹내장(초반이 고임)가 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 당뇨병, 갑상선기능항진증, 고혈압, 빈박, 부정맥, 신장(콩팥) 및 간기능 부전환자 2) 교감신경양 약물(비총혈(코막힘)제거약, 식욕억제제, amphetamine 등의 정신 흥분제), 삼환계 항우울약, 디기탈리스 제제를 투여 받는 환자 3) 기타 다른 중추신경 흥분약을 투여 받는 환자 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분

에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 부작용 1) 구갈(목마름), 두통, 불면, 수면, 무기력, 빈박, 신경과민증, 어지러움증, 현운, 오심(구역) 등이 투여대상 중 1% 이상에서 나타났다. 2) 공포, 흥분, 긴장, 불안, 진전(떨림), 호흡곤란, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 저혈압이 있는 심혈관계 허탈 등이 나타날 수 있다. 3) 피부반응, 혈관부종(부기) 등의 과민증이 일어날 수 있다.

4. 상호작용 1) Monoamine oxidase(MAO) 저해제(억제제), β 2-교감신경 효능 억제제는 교감신경양 작용을 증가시킨다. MAO 저해제(억제제)의 긴 작용시간 때문에 MAO 저해제(억제제) 투여 최소 15일 후 이 약물을 복용한다. 2) 교감신경양 아민

은 methyl dopa, guanethidine, reserpine의 항고혈압 효과를 감소시킨다. 3) 수도에페드린을 디기탈리스와 병용(함께 복용) 투여할 때 전위성 심박(심장박동)조율이 의 활성이 증가될 수 있다. 4) 수도에페드린은 제산제에 의해 흡수속도가 증가되는 반면, 카올린에 의해 흡수 속도가 감소된다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여 : 임신부에 대한 안전성은 확립되지 않았으며 이 약물은 모유로 분비되므로 수유부는 복용하지 않도록 한다.

6. 과량 투여시의 처치 : 과량 투여시 빈박, 부정맥, 고혈압, 중추신경 억제효과(진정, 무호흡, 무의식, 청색증, 심혈관계 허탈증) 또는 자극효과(불면, 환각, 진전(떨림), 경련)가 나타날 수 있다. 즉시 병원으로 옮기고 대증적인 방법을 취하도록 한다. 위세척을 실시하고 고혈압은 α -억제약으로 조절하고 빈박은 β -억제약으로 조절한다. 경련이 나타나면 디아제팜을 정맥 투여한다.

7. 기타 : 운전이나 위험한 기계를 조작하는 경우 주의한다.

※의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭 <http://ezdrug.kfda.go.kr> → 「정보마당」 → 「의약품 등 정보」를 참조하시기 바랍니다.

※이 문서 작성일자(2011년 5월) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.koreamcnuity.co.kr) 또는 전화(☎031-378-1460)를 통하여 확인하실 수 있습니다.