

락토바이 장용
캡슐(바실루스서브틸리스균·
스트렙토코카스페시움균배양물)**ILDONG**

일반의약품

분류번호

237(정장제)

10억 생균을 함유한 고농축 유산균 정장제-

락토바이 장용
캡슐

(바실루스서브틸리스균·스트렙토코카스페시움균배양물)

1. 락토바이 장용캡슐은 10억 생균을 함유한 고농축 유산균 정장제로서 장내균총 이상에 의한 여러 증상 개선에 뛰어난 효과를 발휘합니다.
2. 항생제에 대한 내성이 높아 대부분의 항생제와 병용투여(함께 복용)가 가능합니다.
3. 락토바이는 장용캡슐로 위산에 의한 유산균의 파괴가 없습니다.

원료약품의 분량(1캡슐중)

바실루스서브틸리스균·스트렙토코카스페시움균 배양물(별규)..... 250.0mg
(생균수로서 스트렙토코카스페시움 9.0×10^8 개, 바실루스서브틸리스 1.0×10^8 개)
캡슐기제(타르색소): 황색5호, 황색203호, 청색1호

성상

이 약은 황백색의 분말이 함유된 상부 담녹색(엷은 녹색),
하부 백색의 장용성 경질캡슐제입니다.

IDP

LAC

효능·효과

다음 질환에 사용할 수 있습니다.

장내균총 이상(항생물질, 화학요법제 투여 등)에 의한 여러 증상의 개선: 정장,
변비, 묽은 변, 복부(배부분)팽만감, 장내이상발효

용법·용량

성인 및 만12세 이상의 소아:바실루스서브틸리스균·스트렙토코카스페시움균
배양물로서 1회 125~250mg(0.5~1캡슐, 생균수로서 $5.0 \times 10^8 \sim 1.0 \times 10^9$ 개),
1일 2~3회 복용합니다.
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

ILDONG

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오

의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의하십시오.
- 3) 이약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 소아에 대한 투여

만3개월 미만의 영아(갓난아기)에게 투여할 경우에는 의사 또는 의사와 상의 하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

포장단위

30, 100, 300캡슐

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
습기, 열, 빛은 약의 효과와 안전성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

○ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2012년 11월 6일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우포로 27길 2 (전화) 02-526-3114

공장: 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실: (전화) 080-022-1010 (수신자부담)