

타파 정

(티로프라미드염산염)

위장관 자극을 받으면 위장관은 과잉 수축하고 운동 리듬이 파괴되어 복부통증, 설사, 변비, 과민성 대장증후군 등 여러 증상을 유발합니다. **타파정**은 위장관의 과잉수축을 억제하여 통증을 제거하고 위장관 운동을 정상화하는 새로운 진경제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

티로프라미드염산염(별규) 100mg

동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유), 스테아르산마그네슘(소, 우지)

【성상】 백색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 : 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 : 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

【용법·용량】

◎ 성인 : 티로프라미드염산염으로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구투여 한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. - 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자 2) 거대 결장, 허탈 환자 3) 이 약에 과민증 환자 4) 중증의 간부전 환자 5) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. - 항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응 - 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다. 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
4. 상호작용 - 혈압강하약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의한다.
5. 임부에 대한 투여 - 동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부에의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여한다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

【제조사】 유니메드제약(주) - 충남 아산시 실목로 110-27

첨부문서 작성년월일 : 2014. 06. 13

※ 이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국·병의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 아래의 유니메드제약 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인하실 수 있습니다.

홈페이지 (www.unimed.co.kr) ☎ 고객센터 : 080-500-5100

제조사

UNIMED 유니메드제약

(본사)서울특별시 송파구 잠전로 69 (잠실동) 유니메드빌딩

UM00014