

광범위 피부질환 치료제 데라팍손로션 (데크시메타손)

전문의약품
분류번호: 264

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

데크시메타손(USP)	2.5mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸(KP)	1.5mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필(KP)	0.5mg

【성 상】 흰색의 로션제

【효능·효과】

다양의 코르티코이드 반응성 피부질환 : 접촉피부염, 화폐상피부염, 만성단순태선(신경피부염), 원형홍반성 루푸스, 아토피피부염, 지루피부염, 건선, 발레쿨린데, 한포진, 양진, 간찰진

【용법·용량】

1일 1~3회 적당량을 환부에 바른다. 증상이 완화되면 감량한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 세균(결핵, 매독 등)·진균(칸디다증, 백선 등)·바이러스(대상포진, 단순포진, 수두, 풍두증 등)·동물(곰, 사면발이 등)성 피부감염증 환자(증상이 악화될 수 있다)
- 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 고막 천공이 있는 습진성 외이도염 환자(전공부위의 치유지연이 나타날 수 있다)
- 케언베체트병 제외), 제2도 심재성 이상의 화상·동상 환자(피부재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있다)
- 임주위피부염, 보통여드름, 주사 환자
- 기저귀발진, 항문·생식기가려움 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 유·소아
- 고령자

3. 이상반응

1) 피부

- 감염증 : 피부의 세균성(전염성 농가진, 모낭염 등) 및 진균성(칸디다증, 백선 등), 바이러스성 감염증이 나타날 수 있다.[밀봉봉대법(ODT)의 경우 나타나기 쉽다]. 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항균제나 항진균제 등을 병용하고 증상이 신속히 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지한다.
- 일반적 피부증상 : 모낭염, 부스럼, 피부자극, 자통, 발열, 작열감, 발진, 발적, 홍조, 가려움, 피부건조, 농포성피부염, 알레르기성 접촉피부염, 딱피, 한진, 상처악화, 욕창, 농포증 등이 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
- 정기 연용 : 스테로이드성 여드름, 스테로이드성 피부(피부위축, 모세혈관확장, 자반), 스테로이드성 주사, 임주위피부염(임주위·안면전체에 홍반, 구진, 모세혈관확장, 딱지, 인설), 어린선(漁鱗癬)양 피부변화, 다모, 색소탈실, 선조, 수포성피부염, 아토피피부염, 피부출혈 등이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 천천히 사용량을 줄여 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용한다.
- 내분비계 : 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉봉대법에 의해 코르티코이드 전신 투여와 같은 뇌하수체·부신피질계 기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의한다.
- 눈 : 안검피부에 사용시 안압 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 후낭하백내장, 녹내장 등이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 피부 감염을 수반하는 습진·피부염에는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하지만 부득이하게 이 약을 사용하는 경우에는 먼저 적절한 항균제(전신적용), 항진균제로 치료하거나 이들과의 병용을 고려한다.
- 국소 코르티코이드의 전신적 흡수는 몇몇 환자에서 가역적인 시상하부-뇌하수체-부신(HPA)축의 억제, 쿠싱증후군, 과혈당증, 당뇨 등을 일으킬 수 있으므로 국소 코르티코이드를 광범위한 제표면 또는 밀봉봉대법 하

에 사용하는 환자는 정기적으로 혈중 코르티솔 농도, 요중에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH 자극시험을 하여 HPA축 억제를 검사한다.

- 국소 코르티코이드의 전신적 흡수로 인해 HPA축이 억제되었다면 약물사용의 중지, 투여빈도의 감소, 환성이 약한 코르티코이드로의 대체 등의 방법을 시도하고 일반적으로 국소 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복된다.
- 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.
- 증상이 개선되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지한다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 동물실험에서 비교적 적은 용량의 코르티코이드를 전신적으로 투여한 경우, 좀 더 강력한 코르티코이드 피루도프로 인해 기형발생이 나타났다.
 - 임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용을 피하고 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 이 약이 모유 중으로 이행한다는 보고는 없으나 수유 중에는 이 약 사용을 피한다.
- 소아에 대한 투여
 - 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애 등이 나타날 수 있으므로 주의한다.
 - 기저귀 등은 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의한다.
 - 6세 이하의 유아에는 특별한 경우를 제외하고는 사용하지 않는다.
- 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 부작용이 나타날 수 있으므로 대량, 장기간, 광범위하게(특히 밀봉봉대법) 사용할 경우에는 충분히 관찰하는 등 특히 주의한다.
- 적용상의 주의
 - 안과용으로 사용하지 않는다.
 - 화장이나 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
 - 의사의 감독 없이 밀봉봉대법을 사용하지 않는다.(특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용전에 환부를 청결히 한다.)
 - 4주 이상의 치료와 넓은 부위의 치료(체표면적의 10% 이상)에는 사용하지 않는다.
- 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【포장단위】 20g, 30g

* 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.

* 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관 하십시오.

* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의 약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2016. 07. 18

제조사
태극제약(주)

충청남도 부여군 초촌면 금백로 821