



바닐라향의 구충제 알나졸정 400mg (알벤다졸)

일반의약품
분류번호:642

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

알벤다졸(USP) 400mg

첨가제(타르색소) : 황색5호

[성 상]

연한 옐로우색의 타원형 제형(알 : TG ANZ)

[효능·효과]

회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충, 분선충의 감염 및 이들 혼합감염의 치료

[용법·용량]

- 성인 및 2세 이상의 유·소아
 - 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충 : 400mg을 1회 복용한다. 2세 이상의 유·소아의 요충증은, 200mg을 1회 복용하고 7일 후 200mg을 반복 복용할 수 있다.
 - 분선충 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용한다.
 - 편충의 중증(심한 증상) 혼합 감염시 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용한다.
- * 씹거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사를 중단하거나 하제(설사약)를 쓰는 등의 특별한 과정은 필요없다.
- * 치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 경우에 따라 2차 복용을 실시할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

- 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.

 - 1일 허용량제한
아스파탐 함량을 WHO 권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한 최소량 사용)할 것.
60kg 성인: 1일 최대복용량 2.4g
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약 구성 성분에 과민반응 환자
 - 임부
 - 2세 미만의 영아(갓난아기)
 - 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)수화물 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

테오필린 : 테오필린의 대사를 억제할 수 있다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 및 약사와 상의할 것.
 - 이 약이 모유로 이행되는지에 관해서는 알려진 바 없으나, 이 약 복용 시에는 수유를 중단하는 것이 좋다.
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 피부점막안종후군(스티븐스-존슨증후군), 다형홍반(여러모양의 붉은 반점)이 나타날 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시한다.
- 2) 구역, 구토, 속쓰림, 설사, 상복부 또는 복부(배부분) 통증 등의 위장관(위장차) 장애 또는 두통 및 어지러움이 나타날 수 있다.
- 3) 드물게 발열, 발진, 전신 발적(온몸이 충혈되어 붉어짐), 가려움, 두드러기 등이 나타났다는 보고가 있다.
- 4) 가역적인(회복가능한) 탈모증이 나타날 수 있다.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 이 약 사용 전에는 반드시 임신 중이 아님을 확인한 후에 사용할 것. 임신초기 동안에 이 약의 투여를 피하기 위해서 가임연령(임신가능한 나이)의 여성은 생리 첫 주 동안 또는 임신 테스트에서 음성인 후에 치료를 시작할 것
- 2) 임상검사치에의 영향 : 때때로 가역적인(회복가능한) 백혈구 수의 감소를 유발할 수 있고, 과도한 처방시 범혈구(전체 혈구) 감소증 및 간효소치 이상을 유발 할 수 있다.
- 3) 프라지관텔이 알벤다졸 활성대사체의 혈장농도를 증가시킨다는 보고가 있다.
- 4) 과량투여 했을 경우 대증요법(증상별로 치료하는 방법)(위세척) 및 일반적인 지지 요법을 사용한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사일광(햇빛)의 피하여 건냉한(건조하고 시원한) 곳에 실온 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용) · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 2정

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.

※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국약물안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2015. 10. 08

제조 · 판매자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282
🌐 <http://www.taiguk.co.kr>