

- ※ 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사·약사 또는 식품의약품안전처 (이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려 주시기 바랍니다.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- ※ 직사광선을 피하여 건조한 곳에 실온보관 하십시오.
- ※ 이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 (02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.

[품목기준코드] 200102289

전문의약품

분류번호:222

레보드로프로피진

레드로프로시럽 500mL

판매원

NIELSON

한국넬슨제약

충북 음성군 금왕읍 금일로 271-8

소비자상담실:(02)588-0941

[원료약품의 분량] 100mL 중

레보드로프로피진(BP) 600mg

보존제 : 파라옥시벤조산메틸(KP) 80mg

보존제 : 파라옥시벤조산프로필(KP) 20mg

[성상] 불투명 백색병에 든 딸기향이 첨가된 무색의 시럽제

[효능·효과] 다음 질환에서의 기침 : 급·만성기관지염

[용법·용량] 성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다. 소아 : 레보드로프로피진으로서 적어도 6시간 간격을 두고 투여한다. 10~20kg : 1회 18mg을 1일 3회 경구투여한다. 20~30kg : 1회 30mg을 1일 3회 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절한 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자 2) 기관지 점액 분비 증가 환자 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 5) 중증의 간장애 환자 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자 2) 고령자 3) 만 2세 미만의 영아 3. 이상반응 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량 설사, 구토 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움 3) 순환기계 : 심계항진 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응 4. 일반적 주의 드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다. 5. 상호작용 예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다. 6. 임부 및 수유부에 대한 투여 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다. 7. 보관 및 취급상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

[포장단위] 500mL

[제 조 자] 이니스트바이오제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 34-40

[제조외리자] 한국넬슨제약(주) 충북 음성군 금왕읍 금일로 271-8

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

최종개정일자 : 2015. 09. 22