



프리벤정

Friben Tab.

■ **성분 · 함량** 1정중 알리벤돌(식약청고시)..... 100mg / 첨가제(타르색소) : 적색40호알루미늄레이크 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소,우유)

■ **성상** 분홍색의 장방형 필름코팅정제 ■ **효능 · 효과** 소화불량, 구역, 구토, 변비 등의 증상치료
 ■ **용법 · 용량** 【성인】 알리벤돌로서 1일 300~400mg을 3~4회 분할하여 식전 및 취침시경구투여합니다.
 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ **사용상의 주의사항** 1. 일반적 주의 (1) 다른 약물을 투여하고 있는 경우에는 투여하기 전에 약사 또는 의사와 상의합니다.
 (2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.

2. 소아에 대한 투여 : 이 약은 7세미만의 영 · 유아에게 경구 투여하지 않습니다.

3. 저장상의 주의사항 (1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

(2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.

(3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

4. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당 - 갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

■ **저장방법 · 사용기간** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

■ **포장단위** 자사기준

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하에 제조된(K.G.M.P)적격업체 제품입니다. 만일 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

제조사 : 판매원

개정일자: 2010.02



한국프라임제약

전라북도 원주군 봉동읍 둔산리 865-1.2