

어린이 코감기약

코스펜[®]에이시럽

일반의약품

의약품 분류번호	141 항히스타민제
-------------	---------------

【원료약품의 분량】 100mL 중

트리프롤리딘염산염(BP).....	25mg
수도에페드린염산염(USP).....	600mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP).....	50mg
벤조산나트륨(KP).....	50mg
첨가제(천연색소) : 옐로우칼라 디비 300	

【성상】

체리향이 나는 황색의 시럽제

【효능·효과】

코감기, 알레르기성 및 혈관운동성 비염(코염)에 의한 다음 증상의 완화 :
재채기, 콧물, 코막힘



〈코감기〉



〈재채기〉



〈콧물〉



〈코막힘〉

【용법·용량】

성인 및 12세 이상의 소아 : 1회 10mL, 6~12세 : 5mL, 2~5세 : 2.5mL,
1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
- 2) 심장 또는 신장(콩팥)에 장애가 있는 환자
- 3) 부종(부기)이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본제(이약)의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 글리시리진산으로서 40mg 이상인 제제는 장기 연용(계속 복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
- 3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

3. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아 지드계 이뇨제(트리클로로메타치아지드)와 병용(함께 복용) 시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

4. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 중증(심한 증상)의 간 및 신기능 장애 환자
- 3) 중증(심한 증상)의 관상 심장 질환 환자
- 4) 잔뇨 형성을 수반하는 배뇨장애 환자
- 5) 고혈압 환자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 2세 이하의 영아(갓난아기)
- 8) MAO저해제(억제제)를 투여중인 환자
- 9) 파라옥시안식향산메틸에 과민증 환자

5. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 전식환자
- 2) 녹내장 환자
- 3) 고혈압 및 관상동맥(심장동맥)질환 환자
- 4) 심질환 및 부정맥 환자
- 5) 당뇨병, 감당상기능항진증 환자
- 6) 전립선(전립샘)비대로 인한 배뇨곤란 환자
- 7) 7세 이하의 소아

6. 부작용

- 1) 중추신경계 : 진정, 졸음, 중추 신경 쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한(땀이 남), 경미한(가벼운) 혈압강하, 시력장애, 산동(동공확대), 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직(굳음), 아테토시스, 간대성 및 간직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비가 나타날 수 있다.
- 2) 과민증 : 피부반응, 일시적인 지극통, 작열감(화끈감)이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계 : 구갈(목마름), 구역, 구토가 나타날 수 있다.
- 4) 비뇨기계 : 배뇨곤란이 나타날 수 있다.
- 5) 소아에서 특히 흥분이 나타날 수 있다.

7. 일반적 주의

- 1) 이 약의 투여중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 주의한다.
- 2) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 연용(계속 복용)전에 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 7세 이하의 소아에게는 필요한 경우 시럽제를 복용하되 용법·용량을 잘 지키고 표시된 연령 이외의 소아에게는 투여하지 않는다.
- 4) 이 약은 안식향산 나트륨을 포함하고 있으며, 안식향산은 피부, 눈, 점막에 경미한(가벼운) 자극이 될 수 있다.

8. 약물상호작용

혈압강화제, 알코올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO저해제(억제제), 교감신경흥분제, 삼환계 항우울약, 구아네틴, 브레틸리움 베타나이드, 데브리소퀸, 메칠도파, 교감신경성약(총혈계거제, 식욕억제제, 암페타민류의 신경자극제), α 및 β 아드레날린 저해제(억제제)와 병용(함께 복용)투여하지 않는다. MAO저해제(억제제)의 긴 작용시간 때문에 MAO저해제(억제제) 투여 최소 15일 후 이 약을 투여한다.

9. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 안전성이 확립되지 않았으므로 투여하지 않는다.
- 2) 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는다.

10. 소아에 대한 투여

소아에서 특히 부작용이 크게 나타날 수 있으므로 주의한다.

11. 과량투여시 처치

과량투여시 급성 중독(환각 및 경련), 신경과민, 어지러움, 불면증 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 방광 카테터 삽입법을 사용한다. 수도에페드린 제거에는 투석하도록 한다.

12. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【취급상의 주의】 코스펜에이시럽은 어린이들이 쉽게 개봉하기 어려운 어린이보호용 마개(CRC=Child-Resistant Closure)를 사용하여 약의 오용(잘못사용)·남용 및 어린이 약물중독을 예방하고 있습니다.

【사용법】 ①뚜껑 뒷부분을 누른상태에서 ②시계 반대 방향으로 돌려주세요.

【저장방법 및 사용기간】 차광·기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장 단위】 75mL, 500mL

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 어린이가 함부로 사용하지 않도록 보호자의 각별한 지도·감독에 주의를 기울여 줄 것.
2. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용할 것.
3. 사용 후에는 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.
4. 사용하신 계량컵은 다른 이물질이 묻지 않도록 물에 씻어서 위생보관할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으며,
유리병이 파손될 우려가 있으니 주의할 것.

설명서 개정연월일 : 2010. 04. 10.

제조의뢰자:

Hanmi

한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 방이동 45
(공장)경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

제 조 자: 한국콜마(주) - 충청남도 연기군 전의면 신정리 618-3

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자에게서
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의
제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.



8 801121 003879
Ver.00387004