

【성분·함량】 100mL 중
아세트틸시스테인(USP) 2,000.0mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) 80.0mg
파라옥시벤조산프로필(KP) 20.0mg

【성상】 갈색의 유리병 또는 플라스틱병에 충전된 메론향이 나는 무색 또는 미황색의 투명한 시럽

【효능·효과】 1. 주 효능·효과

1) 다음의 질환에서의 객담(가래)배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 만성섬유증

2) 인·후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성 중이염

【용법·용량】 아세트틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 경구투여(복용)한다.

1. 급성질환 - 성인 : 1회 200mg(10mL) 1일 3회
소아 : 6~14세 : 1회 200mg(10mL) 1일 2회
2~5세 : 1회 100mg(5mL) 1일 2~3회
만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

신생아에 대한 투여와 관련한 안전성은 확립되지 않았다.

2. 만성질환 - 성인 : 1회 200mg(10mL) 1일 2회

소아 : 6~14세 : 1회 100mg(5mL) 1일 3회

3. 만성섬유증 - 소아 : 6세 이상 : 1회 200mg(10mL) 1일 3회

2~5세 : 1회 100mg(5mL) 1일 4회

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약에 과민증 환자 2) 위·십이지장궤양 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여한다.

1) 2세 미만의 소아는 의사의 지시에 따라 의사의 감독 하에 복용하도록 합니다. 2) 신생아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 중증(심한 증상) 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.

3. 이상반응

1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염(입안염), 가슴 쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.

2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명(귀울림) 기관지경련(특히 천식 환자)등이 나타날 수 있다.

3) 드물게 빈맥(빠른맥), 고혈압이 나타날 수 있다.

4) 국내 자발적 유효사례 보고자료(1989~2013 상반기)를 분석한 결과, 유효사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유효사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유효사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곤해당성분과 다음의 유효사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다. • 호흡곤란

타르색소 무첨가의 무색투명

세브론시럽

(아세트틸시스테인)

550mL



(01)08806529009133

본제품은 개봉시 특이취가 발생할 수 있으나 이는 제품의 약효 및 품질과는 무관합니다.



마음까지 건강하게
(주)서울제약

조제용 일반의약품 분류번호 : 222

4. 상호작용 : 경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치알페니콜)과 병용(함께 사용)투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다. (적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다.)
5. 임부에 대한 투여 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
6. 수유부에 대한 투여 : 이 약이 모유로 분비되는지는 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
7. 소아에 대한 투여 : 만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.
8. 적용상의 주의 : 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.
9. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

* 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

<이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용 또는 문의사항은 www.seoulpharma.com이나 (주)서울제약 080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.>

작성일자 : 2015. 10. 14
L SBR550 R04

【제조사】 한국콜마(주)

세종특별자치시 전의면 산단길 245

【제조외지자】 (주)서울제약

경기도 시흥시 경제로 59



뚜껑 : PP

제조번호 :

사용기한 :