

티오시드정(티옥트산)

Thiocid Tablet (Thioctic Acid)

- ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

유효성분 : 티옥트산(KP) 200 mg
 첨가제(타르색소) : 청색2호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크
 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산, 스테아르산마그네슘, 유당수화물, 저치환
 도히드록시프로필셀룰로오스, 클로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 텔크, 폴리에틸렌글리콜400,
 히프로멜로오스

【성상】

녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

당뇨병성 다발성 신경염의 완화

【용법·용량】

- 성인 : 티옥트산으로서 1일 200~600mg을 2~3회 분할하여 식사 30분전에 특별한 처방이 없는 한
 씹지말고 약간의 물과 함께 경구투여 한다.
 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 2) 소아 및 청소년(임상경험이 없다.)
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당
 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-
 galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이상반응
 - 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 설사, 위장관 통증 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 피부 : 드물게 피부발진, 두드러기, 가려움 등의 알레르기 반응이 나타날 수 있다.
 - 3) 드물게 포도당 이용률 증가에 의해 혈당치가 떨어질 수 있다. 이러한 경우 어지러움, 발한,
 두통, 시력장애와 같은 저혈당증 유사증상이 나타날 수 있다.
 - 4) 기타 : 드물게 미각장애가 나타날 수 있다.
 - 5) 국내 시판 후 조사결과(조사종례수 : 2048명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의
 관련 여부는 확실하지 않다. : 소화불량, 빈뇨, 심계항진, 복부팽만감
- 일반적 주의

알코올은 신경병증의 발생과 진행의 중요한 위험 요소이므로 이 약의 치료효과를 감소시킬 수
 있다. 따라서 당뇨병 다발 신경병증을 가지고 있는 환자들은 가능하면 알코올 섭취를 하지 않는
 것이 바람직하다. 이것은 또한, 치료를 하지 않는 때에도 적용된다.
- 상호작용
 - 1) 이 약과 병용투여 시 cisplatin(in vitro상에서 금속착체를 형성함)의 작용이 감소될 수 있다.
 - 2) 인슐린이나 다른 경구용 혈당강하제의 작용으로 인해 혈당치의 감소작용이 증가될 수 있으
 므로 치료의 초기에 혈당치의 엄격한 조절이 필요하며 당결핍 증상을 피하기 위하여
 인슐린의 양이나 경구용 혈당강하제를 줄여야 할 경우도 있다.
 - 3) 이 약은 금속화합물(예 : 철, 마그네슘, 칼슘제제나 우유 등)과 동시에 복용했을 때 체내에서
 불용성 착화합물을 형성하므로 병용투여하지 않는다. 만일 이 약을 아침식사 30분 전에
 복용할 경우 아침이나 점심식사에 철, 마그네슘이나 칼슘제제를 섭취하지 않는다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 생식독성 연구결과 어떠한 태생 독성도 나타내지 않았으나 임부 및 수유부에 대해서는 의사와
 상담하여 약물의 치료상 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

- 2) 약물의 모유송으로의 이행은 알려진 바가 없으므로 수유기에는 투여하지 않는다.

6. 과량투여시의 처치

- 1) 증상 : 이 약으로서 10~40g에 해당하는 양과 알코올을 함께 경구 복용했을 때 심각한 중독
 증상이 관찰된 바 있다. 중독의 임상증상은 초기에 의식의 혼미 또는 정신운동성 불안의
 형태로 나타나며 심해지면 경련과 유산산증이 나타난다. 또한, 이 약의 고용량 중독으로
 저혈당, 속, 횡문근변성, 용혈, 파종성 혈관내 응고, 골수억제, 다발성 기관기능 상실 등이
 나타난 바 있다.
- 2) 처치 : 이 약의 중독이 의심될 경우에는(예 : 성인의 경우 200mg 30정 이상, 300mg 20정 이상,
 소아의 경우 50mg/Kg이상) 즉시 입원하여 중독증상에 맞는 치료를 실시해야 한다(예 : 구토,
 위세척, 활성탄 투여). 경련, 유산산증 등의 심각한 중독에 대해서는 증상에 따른 집중적
 치료를 실시해야 한다. 혈액투석, 관류, 여과 등에 의해서 이 약의 배출이 촉진되는지는 아직
 확인되지 않았다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용에 의한 사고발생
 이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

30정/병, 500정/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나
 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
 작성일 이후 변경된 내용은 '온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)'을 참조하십시오.

작성연월일 : 2018. 02. 19
 EJ2143-09

(주)휴온스

충청북도 제천시 바이오밸리로 100
 소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-447-4700



Head Office : C-902, 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
 Factory : 100, Biovalley-ro, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Korea

FILE NAME 티오시드정 insert

SIZE(mm) 90 X 240

DATE 2018/02/19

VERSION NO. EJ2143-09

COLORS

PANTONE 662C

NOTE

원약분량 변경(착색제 변경-청색2호알루미늄레이크),
 작성연월일 업데이트, 자재코드 업데이트