

졸음 없는 코감기약 ! **세라진·에스TM 캡슐**

Cerazine - S[®] Cap.

세라진-에스TM 캡슐은 콧물, 코막힘, 재채기 등 코관련 증상을 완화하면서도 졸음 등의 부작용이 적은 항히스타민제인 세티리진염산염과 혈관수축작용으로 비충혈(코막힘)을 제거하는 수도에페드린염산염이 이상적으로 복합처방된 펠렛(Pellet) 형태의 서방성 캡슐제제입니다.

세라진-에스TM 의 펠렛은 세티리진염산염과 수도에페드린염산염을 함유하는 속방층과 수도에페드린염산염을 함유하는 서방층으로 구성되어 있어 신속하고도 지속적인 약효를 나타나게 됩니다.

세라진-에스TM 캡슐은 계절성 및 다년성 알레르기 비염(코염)에 지속적인 효과를 발휘하여 알레르기 비염(코염)에 의한 재채기, 콧물, 눈·코의 가려움 등의 증상을 졸음없이 개선시켜주며 기존의 비염(코염)치료제와는 달리 비충혈(코막힘)에도 그 효과가 탁월합니다.

■ 원료약품의 분량

1캡슐 중	
세티리진염산염(BP).....	5mg
수도에페드린염산염(KP).....	120mg
첨가제(타르색소) : 적색3호	

■ 성상

백색의 구형과립이 들어 있는 상부 회색, 하부 연분홍색의 캡슐제

■ 약리작용 및 특징점

1. 특수 제작된 펠렛 형태의 지속성 제제 **세라진-에스TM** 은 세티리진염산염과 수도에페드린염산염을 함유하는 속방층과 수도에페드린염산염을 함유하는 서방층을 함께 포함하고 있어 12시간 이상 약효를 지속하므로 1일 2회, 1회 1캡슐 복용으로도 그 효과가 충분합니다.
2. 코막힘에 더욱 효과적입니다. 일반 알레르기 치료제로 알레르기성 비염(코염) 치료 시, 가장 치료하기 힘든 코막힘 즉 비충혈(코막힘) 현상에도 세티리진과 수도에페드린이 복합 처방된 **세라진-에스TM** 캡슐은 그 효과가 탁월합니다.
3. 뇌에 미치는 효과가 거의 없습니다. **세라진-에스TM** 캡슐은 혈액 뇌관문을 통과하지 않고 말초에 있는 H1-히스타민 수용체에만 선택적으로 작용하므로 졸음이나 진정작용이 거의 없으면서도 그 효과는 다른 약물들과 동등하므로 정신집중이 필요한 사람들도 사용할 수 있습니다.
4. **세라진-에스TM** 캡슐은 작용이 신속합니다. 투여 후 신속히 흡수되어 투여한 시간에 그 혈중치가 최고치에 도달하므로 작용 발현(드러냄)이 매우 빨라 알레르기 증상을 신속히 없애줍니다.

■ 효능·효과

다음 증상을 수반하는 계절성 및 다년성 알레르기 비염(코염)의 완화 : 코막힘, 재채기, 콧물, 눈·코의 소양증(가려움증)

■ 용법·용량

1. 12세 이상의 소아와 성인
식사와 관계없이 1회 1캡슐씩 1일 2회(아침, 저녁) 복용한다.
이 약은 씹거나 부수어서 복용하지 말고 그대로 삼켜서 복용한다.
2. 이 약은 2~3주 이상 복용하지 않도록 한다.
3. 신기능 저하 환자 및 간기능 저하 환자의 경우 감량(줄임)하여 1회 1캡슐씩 1일 1회 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
(1) 이 약 또는 ephedrine 또는 piperazine류에 과민증이 있는 환자
(2) 심각한 고혈압 또는 심각한 관상 동맥(심장동맥) 환자
(3) monoamine oxidase 저해제(억제제)를 투여받고 있는 환자
(4) 안내압(눈내부 압력)이 증가되어 있거나 뇨자류(소변이 고임)가 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
(1) 당뇨병, 갑상선 기능 항진증, 고혈압, 빈박, 부정맥, 신장(콩팥) 및 간기능 부전환자
(2) 교감신경양 약물(비충혈(코막힘) 제거약, 식욕억제제, amphetamine 등의 정신흥분제), 삼환계 항우울약, 디기탈리스 제제를 투여받는 환자
(3) 기타 다른 중추신경 흥분약을 투여받는 환자
3. 부작용
(1) 구갈, 두통, 불면, 수면, 무기력, 빈박, 신경과민증, 어지러움증, 현운(현기증), 오심(구역) 등이 투여대상 중 1% 이상에서 나타났다.
(2) 공포, 흥분, 긴장, 불안, 진전(떨림), 호흡곤란, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 저혈압이 있는 심혈관계 허탈 등이 나타날 수 있다.
(3) 피부반응, 혈관부종(부기) 등의 과민반응이 일어날 수 있다.
4. 상호작용
(1) monoamine oxidase 저해제(억제제), β_2 -교감신경 효능 억제약은 교감신경양 작용을 증가시킨다. MAO 저해제(억제제)의 긴 작용시간 때문에 MAO 저해제(억제제) 투여 최소 15일 후 이 약물을 복용한다.
(2) 교감신경양 아민은 methyl dopa, guanethidine, reserpine의 항고혈압 효과를 감소시킨다.
(3) 수도에페드린을 디기탈리스와 병용(함께 복용) 투여할 때 전위성(변위) 심박 조율기의 활성이 증가될 수 있다.
(4) 수도에페드린은 제산제에 의해 흡수속도가 증가되는 반면, 카올린에 의해 흡수속도가 감소된다.
5. 임신부에 대한 안전성은 확립되지 않았으며 이 약물은 모유로 분비되므로 수유부는 복용하지 않도록 한다.
6. 과량투여시의 처치
과량투여시 빈박, 부정맥, 고혈압, 중추신경억제효과(진정, 무호흡, 무의식, 청색증, 심혈관계 허탈증) 또는 자극효과(불면, 환각, 진전(떨림), 경련)가 나타날 수 있다. 즉시 병원으로 옮기고 대증적증상에 대응하여인 방법을 취하도록 한다. 위세척을 실시하고 고혈압은 α -억제약으로 조절하고 빈박은 β -억제약으로 조절한다. 경련이 나타나면 디아제팜을 정맥 투여한다.
7. 기타
운전이나 위험한 기계를 조작하는 경우 주의를 요한다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 6캡슐(3일분)

■ 제조원 : 삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52 (제조의뢰자) 한국맥넬티(주) - 경기도 화성시 동탄면 영천로9 (제조자)

※ 주의

1. 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
2. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용하지 마십시오.
3. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
4. 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
5. PTP 포장을 개봉하여 복용 시 가끔 캡슐제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 캡슐제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.
6. 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2013년 10월 8일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)을 통해 알 수 있습니다.

10013

CRZ-03-07-1171

판매 원



삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 외우산로 121 (서교동)
공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52
☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6