

007-2405

전문의약품

파마킹 **티로미드 정**
(티로프라미드염산염)



전문의약품

분류번호 : 124

광범위 진경제

파마킹 **티로미드 정**
(티로프라미드염산염)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분: 티로프라미드염산염(별규) 100.0mg

첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원: 소, 우유)

기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 산화티탄, 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 셀룰로오스, 폴리비닐피롤리돈, 히프로멜로오스2910

【성상】

흰색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 질환에서의 급성 경련성 동통: 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
- 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통: 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

【용법·용량】

- 성인: 티로프라미드염산염으로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구투여한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
 - 거대 결장, 허탈 환자
 - 이 약에 과민증 환자
 - 중증의 간부전 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여한다.
- 이상반응
 - 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 상호작용
혈압강화약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강화효과가 상승될 수 있으므로 주의한다.
- 임부에 대한 투여
동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여한다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

【포장단위】

30정(병), 200정(병)

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

- ※ 의약품을 사용하시기 전에 본 설명서를 주의깊게 읽어주시기 바라며, 설명서는 반드시 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 때는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 자세한 내용은 자사로 문의하시기 바랍니다. (소비자상담실 : 070-4789-2700)
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 설명서 (재)작성일 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(<http://www.pharmaking.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국 의약품안전관리원에 할 수 있습니다.

신청방법 ☎ 1644-6223, 14-3330 | 🌐 karp.drugsafe.or.kr

신청대상 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

보상범위 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

(재)작성일 : 2024. 05. 24



KGMP 적격업체
주식회사 파마킹

충청북도 음성군 감곡면 행군이길 87-17