풀어주는 관절염 치료제

푸로탑 플라스타 (플루르비프로펜)

일반의약품	
분류번호	264

일반의약품 정보

[유효성분] 1매(7 X 10㎠, 1.135g) 중

플루르비프로펜 (KP) .... 20 mg

[효능·효과] 다음 질환 및 증상의 진통·소염[항염] : 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절 주위염, 건[힘줄]·건초염[힘줄윤활막염], 상완골[위팔뼈]상과염(테니스엘보우 등), 근육통, 외상[상처] 후의 종창[부기]·동통[통증]

[용법·용량] 약면의 박리[벗겨짐]지를 떼어낸 후 환부[질환 부위]에 1일 2회 부착하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약 및 기타의 플루르비프로펜 제제에 과민증의 병력이 있는 환자 2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염[항염]진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다.)

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다.)

3. 부작용

1) 때때로 발적[충혈되어 붉어짐], 발진, 약진[약물발진], 가려움 및 작열감[화끈감], 접촉 피부염이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지 하십시오. 2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성수포음[거품소리], 천명[숨을 쌕쌕거림], 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오. 천식발작은 이 약의 부착 후 수 시간 내에 나타납니다.

4. 일반적 주의

1) 소염[항염]진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법[증상별로 치료하는 방법] 임에 유의하십시오. 2) 피부감염증을 불현성화[겉으로 드러나지 않게] 시킬 수 있으므로 감염을 수반하는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균[곰팡이]제를 병용[함께 사용]하고 충분히 관찰하여 신중히 투여하십시오. 3) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 이 약을 사용할 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려하십시오. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발현[드러냄]에 유의하십시오.

5. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회[웃돎]한다고 판단될 경우에만 투여하십시오.

6. 소아에 대한 투여

소아에는 안전성이 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다.)

7. 고령자[노인]에 대한 투여

고령자[노인]에는 이 약의 부착 부위의 피부상태에 주의하며 신중히 투여하십시오.

8. 적용상의 주의

1) 손상된 피부와 점막에는 사용하지 마십시오. 2) 습진 또는 발진부위에는 사용하지 마십시오. 3) 적용부위의 땀을 닦아낸 후 사용하십시오.

[저장방법] 차광한 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 10매

[사용기한] 제품 뒷면 하단 표시일까지

[첨가제] • 기타 첨가제 : l-멘톨, 디부틸히드록시톨루엔, 린트포, 박리지, 소르비탄올레에이트, 아크릴계점착용액(아크릴계점착제로서 300mg), 조합향료(카모마일향), 토코페롤아세테이트, 폴리에틸렌글리콜4000

[성상] 미황색의 점착성 물질을 살구색 린트포상에 도포하여 점착면에 박리지를 덮은 첩부제입니다.

이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 사용 전 반드시 포장의 기재사항을 확인하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상 받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 상기 표시 사항 중 작성일자 (2018년 6월 27일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자 상담실 080-260-0033로 문의하시기 바랍니다.

[안전한 사용방법]

- 사용 전에 설명서를 상세히 읽어 보시고 효능, 효과상에 기재된 용도 이외에 임의대로 제품을 부착하지 마십시오.
- 목과 같이 연약한 부위나 피부 또는 모발이 많은 부위에 부착한 경우에는 미온수로 적당히 불려서 떼어내십시오.
- 피부 알러지 방지를 위하여 동일부위에 연속적으로 사용하는 것은 피해주시고 가려움증이나 발적, 발진이 나타날 경우 사용을 중지하고, 환부를 흐르는 찬물에 담가주십시오.
- 사우나, 온찜질 전후에는 피부각질이 약해지고 내피가 손상되기 쉬우므로 본 제품 부착시 주의하십시오.
- 피부에 이상 증상이 생겼을 때에는 긁거나 손대지 말고 즉시 의사 또는 약사와 상의하십시오.

제조판매자
GC 녹십자
(주)녹십자
충청북도 음성군 금왕읍 무극로65번길 26
TEL. 031)260-9300 소비자상담실 TEL.080-260-0033

비닐류
OTHER

호일-20-4108-4

(01)08806436017320

제조번호 :

사용기한 :

인쇄크기 40x18mm
인쇄시 적색 문구, 박스 삭제해주세요.

GC 녹십자

카모마일 향 함유

풀어주는 관절염 치료제

푸로탑

플라스타 (플루르비프로펜)

관절염

근육통

외상후 동통

10 매

8 806436 017320