

의 약 품	122
분류번호	골격근이완제

외페리손염산염정



에페리손염산염정명서-1510-A

의 약 품	122
분류번호	골격근이완제

외페리손염산염정

골격근이완제
EperisoneHCl tab.

전문의약품

【원료약품의 분량】 1정 중
에페리손염산염(별규) 50mg

【성상】 백색의 원형 당의정

【효능·효과】

- 근골격계질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경간완중후군, 견관절주위염, 요통
- 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측삭경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수시신경병변, 기타의 뇌척수질환

【용법·용량】

성인 : 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여 합니다.
연령, 증상에 따라 적절한 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 중증의 근무력증 환자
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있습니다)
- 부작용
 - 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
 - 2) 간장 : 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
 - 3) 신장 : 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
 - 4) 혈액 : 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다.
 - 5) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 정신신경계 : 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있습니다.
 - 8) 비뇨기계 : 드물게 요폐, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있습니다.
 - 9) 전신증상 : 때때로 무력감, 비틀거림, 전신권태감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있습니다.
 - 10) 기타 : 때때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있습니다.
- 일반적 주의
 - 1) 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지합니다.
 - 2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.
- 상호작용

이 약의 유사약품인 염산톨페리손과 메토카르바몰을 병용시 시조절장 장애가 나타났다는 보고가 있습니다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
 - 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단합니다.
- 소아에 대한 투여


소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다).
- 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 자사포장단위

【교환 및 제품문의】 이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주시시오. 고객센터팀 : 1588-2675



제조의처
JW 제약
제이디블유제약(주)
충남 당진시 송악읍 한진길 56

제조사
아주약품(주)
경기도 평택시 산단로 121번길 23