

# 토 베 손 점안액

(토브라마이신·덱사메타손)

토베손은 G(+)-균 및 G(-)-균에 유효한 광범위 항균제 토브라마이신 0.3%와 염증치료에 효과가 높은 덱사메타손 0.1%의 복합현탁액으로 감염과 염증반응을 신속히 치유합니다.

【성분·함량】 1ml 중  
토브라마이신(USP).....3mg(역가)  
덱사메타손(KP).....1mg  
첨가제(보존제):벤잘코늄염화물(KP).....0.1mg  
첨가제(안정제):에데트산나트륨수화물(KP)  
첨가제(안정제):염화나트륨(KP)  
첨가제(안정제):티록사폴(USP)  
첨가제(완충제):무수황산나트륨(EF)  
첨가제(점도조절제):포비돈K25(JP)  
첨가제(pH조절제):황산(EF)  
첨가제(pH조절제):수산화나트륨(KP)  
첨가제(용제):말균정제수(KP)

【성상】 투명 플라스틱 용기에 든 흰색의 현탁성 점안액

## 【효능·효과】

- 다음의 토브라마이신 감수성균에 의한 감염증:
  - 포도상구균 : 황색포도상구균, 표피포도상구균(응고촉진효소양성 및 음성균 포함), 페니실린 내성균 등
  - 일부 A군의 β-용혈성 연쇄상구균, 비용혈성 연쇄상구균 및 폐렴구균
  - 녹농균, 대장균, 폐렴간균, 호기성 장내균, 프로테우스 미라비리스, 모르가넬라 모르가니균, 대부분의 심상 변형균, 헤모필루스 인플루엔자균, 헤모필루스 에지티우스균, 결막염 효염균, 아시네토박터 칼코아 세티쿠스균, 일부의 나이제리아속
- 다음의 스테로이드 반응성 눈의 염증 및 안과질환:
  - 표재성(표면에 있는) 세균감염, 안검(눈꺼풀) 및 안구(눈) 결막·각막, 안구(눈) 전방부의 염증, 만성 전포도막염, 화학물질·방사선·열성 외상(상처) 또는 이물침투에 의한 각막 상해

## 【용법·용량】

성인 : 이 약을 4~6시간 간격으로 결막낭(결막주머니)내에 1~2방울 점안(눈에 넣음)합니다. 초기 24~48시간 동안 2시간 간격으로 1~2방울 투여하고 증상이 개선되면 점차 감량(줄임)하며 조기에 투여중지하지 않습니다.

## 【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
  - 1) 상피(겉피부)의 단순 헤르페스각막염(수지상각막염), 우두, 수두 및 각막과 결막의 바이러스성 질환, 안(눈) 결핵, 눈의 전구성 질환 환자
  - 2) 이 약에 과민증 환자
  - 3) 소아, 수유부
- 부작용
  - 1) 눈꺼풀의 가려움증 및 부종(부기), 결막 발적(충혈되어 붉어짐) 등 국소적인 부작용 및 과민증이 나타날 수 있다.
  - 2) 시선경 손상이 수반되는 녹내장, 시력·시야감퇴, 백내장 형성, 안구(눈)천공(툰림), 상처 치유의 지연 등이 나타날 수 있다.

뒷면이어짐>>

## 【저장방법 및 유효기간】

기밀용기, 실온보관(1~30℃) 유효기간 : 제조일로부터 24개월

## 【포장단위】 5ml, 6ml

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

## ※ 주의

1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
5. 정안(눈에 넣음)시 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
6. 뚜껑을 잘 닫아 보관하시고 치료 종료후 남은 점안액이 있을시 이후 재사용하지 않는 것이 좋습니다.
7. 사용전에 잘 흔들어서 사용하십시오.

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831



대우제약(주)

부산광역시 사하구 대대로 153 (신정동)  
http://www.daewoopharm.com

최종개정년월일: 2015. 05. 06  
작성년월일: 2015. 05. 26

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 5월 26일)이후 변경된 내용은 <http://www.daewoopharm.com>나 051-204-3831(대우 제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.

- 3) 이 약을 다른 아미노글리코사이드계 전신투여제와 병용(함께 사용)투여할 경우 총 혈청농도를 모니터링해야 하며, 민감한 반응이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 4) 눈의 급성 화농(뽀름)성 감염시 스테로이드는 감염을 은폐하거나 촉진시킨다.
- 5) 스테로이드의 장기 연용(계속 사용)시 각막의 진균감염이 나타날 수 있다. 스테로이드 요법 후 지속적인 각막궤양시 진균감염을 의심해야 하며 면역억제에 따른 눈의 2차 세균감염도 나타날 수 있다.
- 6) 과량 투여시 점상각막염, 홍반, 부종(부기), 눈꺼풀의 가려움증, 눈물증가 등이 나타날 수 있다.
3. 일반적 주의
  - 1) 장기 연용(계속 사용)에 의해 진균등 비감수성 병원균의 교대현상이 나타날 수 있다.
  - 2) 다른 아미노글리코사이드계 항생물질에 교차감염이 나타날 수 있다.
  - 3) 재감염의 경우 적절한 치료를 한다.
4. 임부에 대한 투여  
임신 중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
5. 소아에 대한 투여  
소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.
6. 적용상의 주의
  - 1) 눈에 주사하지 않고 점안(눈에 넣음)용으로만 사용한다.
  - 2) 정안(눈에 넣음)시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의한다.
  - 3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.
7. 저장상의 주의사항
  - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
  - 2) 직사광선을 피하고 되도록(습기가 적은) 서늘한 곳에[밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아)] 보관한다.
  - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.