

티프로정

(티로프라미드염산염)

원료약품 및 그 분량 1정 중

- 유효성분 : 티로프라미드염산염(별규).....100 mg
- 첨가제 : 옥수수전분, 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 포비돈K30, 스테아르산마그네슘, 탈크, 경질무수구산, 히프로멜로오스2910, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄

성상

흰색의 원형필름코팅정

효능·효과

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 : 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부(배 부분)산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부(배 부분) 경련 및 동통 : 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭(쓸개)염, 수술 후 유착(붙음)

용법·용량

- 성인 : 티로프라미드염산염으로서 1회 100 mg 1일 2-3회 경구투여하십시오(먹습니다).
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착(좁아짐)된 환자
 - 2) 거대 결장, 허탈 환자
 - 3) 이 약에 과민증 환자
 - 4) 중증(심한 증상)의 간부전 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여합니다.
3. 이상반응
 - 1) 구갈(목마름), 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 가려움, 홍반(붉은 반점) 등의 알레르기증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
4. 상호작용

혈압강화약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강화효과가 상승될 수 있으므로 주의하십시오.
5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여합니다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

30정, 500정

취급상의 주의사항

- ※ 이 첨부문서 개정일자(2021년 12월 13일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 본 제를 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국 의약품안전관리원(T.14-3330(상담) 또는 1644-6223(신고 및 상담))에서 할 수 있습니다.
- ☎ 소비자상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정 연월일 : 2021. 12. 13

APROGEN

에 이 프 로 제 약 (주)
경기도 화성시 양감면 두머리길 16

제조의뢰자:에이프로제약(주) - 경기도 화성시 양감면 두머리길 16
제조사:대원제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 24