

진해거담제 & 기침감기약 세브론에이시럽

【성분 · 함량】 100mL 중	
아세틸시스테인(USP)	2,000.0mg
클로르페니라민말레산염(KP)	40.0mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	8mg
파라옥시벤조산프로필(KP)	2mg

【성 성】
갈색의 유리병 또는 플라스틱병 또는 알루미늄 호일파우치에 들어있는 메론향이 나는 무색 또는 미황색의 투명한 시럽

【효능 · 효과】
1. 다음의 질환에서의 기침, 가래 : 급 · 만성 호흡기 질환(기관지염, 인후두염, 비인두염 등)
2. 소아의 유행성 감기, 감기시 기침

【용법 · 용량】
소아(3~12세) : 1회 5mL 통상 1일 3회
성인 및 12세 이상 : 1회 10mL 통상 1일 3회
연령, 증상에 따라 적절히 증감 하십시오.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약에 과민증 환자
2) 위 · 십이지장궤양 환자
3) 이 약 또는 유사 화합물에 과민증의 병력이 있는 환자
4) 녹내장 환자(항콜린 작용에 의해 안압이 상승되어 녹내장이 악화될 수 있다.)
5) 전립선비대 등 하부요로폐색성 질환 환자
6) 미숙아 및 신생아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 안내압 상승 환자
2) 갑상선기능항진 환자
3) 협착성소화성궤양 또는 유문십이지장 폐색 환자(항콜린 작용에 의해 평활근의 운동억제, 긴장 저하가 일어나 증상이 악화될 수 있다.)
4) 순환기계질환 환자
5) 고혈압 등 심혈관계 질환 환자
6) 간질 환자
7) 기관지염, 기관지확장증 및 천식환자
8) 간질환자
9) 신생아(중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.)
3. 이상반응
1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴 쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.
2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지 경련(특히 천식 환자)등이 나타날 수 있다.
3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있다.
4) 속이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰을 하고 현색증, 호흡곤란, 흉부불쾌감, 혈압저하 등이 나타나 는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
5) 경련, 착란이 일어날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나면 감량 또는 휴약 등 적절한 처치를 한다.
6) 재생불량성빈혈, 무과립구증이 나타날 수 있으므로 혈액검사를 하여 충분히 관찰하고 이상이 인정 되는 경우에는 투여를 중지한다.
7) 과민증 : 발진, 과민증, 발진성 피부염, 두드러기, 연속, 근허약, 협소불능이 나타날 수 있다.
8) 정신신경계 : 진정, 졸음, 신경과민, 두통, 초조감, 복시, 불면, 어지러움, 이명, 전정장애, 다형증, 정서불안, 히스테리, 진전, 신경염, 협소이상, 감각이상, 무시, 집중력 감소, 권태감이 나타날 수 있다.
9) 소화기계 : 구갈, 가슴쓰림, 식욕부진, 소화불량, 구역, 구토, 복통, 변비, 설사 등이 나타날 수 있다.
10) 비뇨기계 : 빈뇨, 배뇨곤란, 요폐, 요저류 등이 나타날 수 있다.

1) 호흡기계 : 코 또는 기도의 건조, 기관분비액의 점성화, 천명, 코막힘이 나타날 수 있다.
2) 혈액 : 용혈성빈혈, 혈소판감소가 나타날 수 있다.
3) 기타 : 오한, 발한이상, 홍통, 피로감, 월경이상이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
졸음을 유발할 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의 한다.
5. 상호작용
1) 경구용 항생물질/아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치말페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다. (적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다.)
2) 알코올, 중추신경억제제 병용시 졸음을 유발할 수 있다.
3) 클로르페니라민은 페니토인 대사를 억제하여 페니토인 독성을 유발할 수 있다.
6. 임부에 대한 투여
1) 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.
2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 신중히 투여한다.
7. 수유부에 대한 투여
이 약이 모유로 분비되는지는 알려지지 않았으나 많은 약물이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
8. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하여 신중히 투여해야 한다.
9. 과량투여시의 처치
클로르페니라민의 치사량은 체중 kg당 25~50mg이다.
증상으로는 진정, 중추신경계 비정상적 자극, 중독성 정신병, 경련, 무호흡, 정신착란, 항콜린효과, 실조증, 부정맥을 비롯한 심혈관계 허탈증 등이 나타날 수 있으며 이 때에는 토근시럽을 이용해 구도를 유발시키거나 위세척을 한다.
10. 적용상의 주의
이 약의 용역에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

【포장단위】 10mL×90포

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
* 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
* 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
(이 첨부서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.)

작성일자 : 2015. 06. 30
I SBAC R01

【제조자】 셀티스(주) / 충북 충주시 대소원면 청단산업1로 120

【제조회자】 (주)서울제약 / 경기도 시흥시 경제로 59