

비스론 캡슐

(고지혈증 치료제)

	전문의약품	
	의약품 분류번호	218 동맥경화 용제
우수의약품지정업체		

비스론은 기존의 fenofibrate 제제를 미세화하여 체내 흡수율을 향상시킨 제제로 lipoprotein lipase의 합성과 지방산의 산화를 활성화시키는 PPARα(Peroxisome Proliferation activated receptor α)에 작용하여 혈중 Triglyceride와 LDL-Cholesterol치를 낮추어줍니다.
비스론은 혈중 HDL-Cholesterol치를 높여주므로 고지혈증 환자의 동맥경화 위험을 낮추어줍니다.

【성분·함량】 1캡슐 중
페노피브레이트 과립(미분화)(별구).....301.95mg
페노피브레이트로수 200mg
첨가제(타르색소): 적색3호, 황색5호

【성상】 흰색의 구형 미세과립을 함유한 상·하부 주황색의 경질캡슐제

【효능·효과】
원발성 고지혈증 : 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(IIb형, III형), 고트리글리세라이드혈증(IV형)

【용법·용량】
○ 성인 : 페노피브레이트로수 1일 1회 200mg을 식후 즉시 경구투여한다.
○ 소아 : 소아에 대한 이 약의 사용에 관한 임상자료는 아직 없다.
○ 페노피브레이트는 반드시 식이요법과 병행하여 투여한다. 이 약은 빈식에서는 흡수가 덜 될 수 있으므로 식후 즉시 투여한다(145mg 제제 제외).
○ 고령자 : 신기능이 감소되지 않은 경우 일반적으로 용량 감량이 필요하지 않다.
○ 신장애 환자 : 중등도~중증 신장애 환자(혈청 크레아티닌치 2.5mg/dL 이상)의 경우 이 약을 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. **다음 환자에는 투여하지 말 것.**
 - 1) 간장애 환자
 - 2) 중등도~중증 신장애 환자(혈청 크레아티닌치 2.5mg/dL 이상)(황문근용해증이 나타날 수 있다.)
 - 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 4) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 5) 선제성 담낭질환 환자(담석형성이 보고되었다.)
 - 6) 신장기능이 낮은 경우(크레아티닌치 2.5mg/dL 이상)의 환자
2. **다음 환자에는 신중히 투여할 것.**
 - 1) 경증 신장애 또는 그 병력이 있는 환자(혈청 크레아티닌치 1.5mg/dL 이상 2.5mg/dL 미만)(황문근용해증이 나타날 수 있으므로 투여량을 감량 또는 투여간격을 연장하여 투여한다.)
 - 2) 간기능 검사에 이상이 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자(간기능 검사값의 이상변동이 나타날 수 있다.)
 - 3) 자발부인혈증(신중후군) 환자
 - 4) 담석의 병력이 있는 환자(담석형성이 보고되었다.)
 - 5) 혈액응고저지제를 투여중인 환자
 - 6) HMG-CoA 환원효소저해제(에, 프라바스타틴, 심바스타틴 등)를 투여중인 환자
 - 7) 고령자
 - 8) 이 약은 황색5호(선선텔로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. **이상반응**
 - 1) 간담도증 : 때때로 혈청 아마노전달효소치 상승, 드물게 간종대, 매우 드물게 담즙 울체성 간염, 담석이 나타날 수 있다.
 - 2) 피부 : 자주 발진, 가려움증 등은 광민감반응 : 태양광 또는 인공 UV광선 노출로 피부 일부분에 홍반, 소포형성 또는 피부결절을 동반한 피부 광민감반응이 나타날 수 있으며, 드물게 탈모가 나타날 수 있다.
 - 3) 신경계 : 무력증, 고체온, 자주 어지럼, 두통, 드물게 말초신경병증이 나타날 수 있다.
 - 4) 혈관계 : 때때로 혈전색전증(폐색전증, 심부정맥혈전증)이 나타날 수 있다.
 - 5) 근골격계 : 때때로 크레아티닌키나아제(CK) 상승(정상치의 5배 이상), 근육통, 근경련이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 휴약한다. 또한 매우 드물게 관절통, 광과민성 환자 황문근용해증이 나타날 수 있다. 특히 신기능장애 환자는 근육통, 무력감, 크레아티닌키나아제(CK) 상승, 혈중 및 뇨중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 황문근용해증 및 이에 수반되는 급격한 신기능 악화가 나타날 수 있으므로 주의한다.
 - 6) 과민반응 : 두드러기, 광과민성 습진 등의 광독성, 광민감반응이 나타날 수 있다.
 - 7) 소화기계 : 자주 위장관 장애(복통, 구역, 구토, 설사 및 복부팽만감), 때때로 체중감이 나타날 수 있다.
 - 8) 호흡기계 : 매우 드물게 간질폐이상이 나타날 수 있다.
 - 9) 혈액 : 드물게 헤모글로빈 감소, 백혈구 감소, 매우 드물게 호산구증가증이 나타날 수 있다.
 - 10) 신장 : 드물게 혈청 크레아티닌 및 요소의 상승이 나타날 수 있다.

뒷면 이어저>>

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온보관(1~30℃) 사용기간 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30캡슐, 300캡슐

* 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 주의

1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■제조업자 : 대우제약(주) - 부산광역시 사하구 대대로 153 (신평동)

■제 조 자 : (주)한국파마 - 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87



대우제약(주)

부산광역시 사하구 대대로 153 (신평동)
http://www.daeuopharm.com

소비자상담전화 (서울)02-3477-1791 (부산)051-204-3831

최종개정년월일: 2013. 01. 29
작성년월일: 2013. 01. 15

* 이 첨부문서 작성일자(2013년 1월 15일)이후 변경된 내용은 http://www.daeuopharm.com이나 051-204-3831(대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.

11) 기타 : 호산구성 폐렴, 심실성 부정맥, 자주 피로, 드물게 성기능장애, 매우 드물게 체중 증가가 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 신장애 환자에서는 급격한 신기능악화를 수반하는 황문근용해증이 나타날 수 있으므로 투여 받은 환자의 신기능을 검사하여 투여여부를 결정하고 혈청 크레아티닌치에 따라 감량 또는 투여간격 연장 등 적절한 처치를 한다.
- 2) 투여전에 충분한 검사를 실시하고 고지혈증임을 확인한 후에 투여를 고려한다.
- 3) 투여중에 미리 식이요법을 실시하고 운동요법이나 고혈압, 흡연 등 허혈성 심질환에 대한 위험인자 감량 등도 충분히 고려한다.
- 4) 투여중에 혈중 지질 농도를 정기적으로 검사하고(3개월 정도 투여하여도) 치료효과가 인정되지 않은 경우에는 투여를 중지한다.
- 5) 간기능 : 이 약 1일 96~145mg 투여 용량이 혈청 아마노전달효소(AST 또는 ALT) 상승과 연관되어 있다. 10개 위약대조-통제 임상시험에서 정상범위 상한값의 3배 초과 증가가 이 약 복용군에서는 5.3%, 위약군에서 1.1%가 나타났다. 아마노전달효소 시험을 치료 중단 후 또는 지속치로 동안 이후에 수행하였을 때, 일반적으로 정상범위로 되돌아 왔다. 이 약 치료와 연관된 아마노전달효소 증가 발생률은 용량과 연관되어 보였다. 8주-용량-범위 시험에서, 이 약물 1일 96~145mg 용량을 투여받은 환자에서 정상범위 상한값의 최소 3배의 ALT 또는 AST 상승 발생률은 13%였고, 위약군 또는 이 약 1일 45mg 이하를 투여한 환자에서의 발생률은 0%였다. 이 약 치료와 연관된 간세포괴염, 만성활동성간염 및 담관정체간염이 이 약 투여 후 수년 후 보고되었다. 극도의 드문 사례에서 만성활동성간염과 연관된 간경화증이 보고되었다.
- 6) AST, ALT, γ-GTP, LDH, ALP의 상승, 황달 및 간염이 나타날 수 있으므로 간기능검사는 투여 시작 3개월까지 매월, 그 후 3개월마다 시행한다. 이상이 인정되는 경우 감량 또는 휴약하는 등 적절한 처치를 하고 동시에 최소한 1개월 이내에 간기능검사를 실시해야 한다. 또한, AST 또는 ALT가 계속해서 정상상한의 2.5배 또는 100IU를 초과하였을 경우 투여를 중지한다.
- 7) 담석증 : 담석증을 초래할 수 있는 콜로피브레이트 및 겐피프로질과 같이, 이 약은 담즙으로 콜레스테롤 배설을 증가시킬 수 있다. 담석증이 의심되는 경우, 담낭조사를 적용해야 한다. 담석이 발견되는 경우 이 약 치료는 중단되어야 한다.
- 8) 체중감 : 페노피브레이트, 겐피프로질 및 콜로피브레이트를 복용하는 환자에서 체중감이 보고되었다. 이러한 발생은 직접 약물효과 또는 총담관 폐색을 동반하는 담석이나 침착물 형성을 매개하는 2차 현상으로 인한 중증 고트리글리세라이드혈증 환자에는 이 약물의 효능 실패로 볼 수 있다.
- 9) 과민반응 : 드물게 피부점막만종후군(스티븐스-존슨 증후군)과 독성피피로사용해(리엘증후군)의 간질적 보고를 포함하여 임원이 요구되고 스테로이드 치료가 필요한 피부발진을 포함한 급성 과민반응이 이 약 치료동안 매우 드물게 나타났다. 통제 임상시험에서 두드러기는 이 약 1.1%, 위약군 0%, 발진은 이 약 1.4%, 위약군 0.8%로 나타났다.
- 10) 혈액학적 변화 : 페노피브레이트 치료를 시작한 환자에서 경도~중등도 헤모글로빈, 헤마토크리트 및 백혈구의 감소가 관찰되었다. 그러나 이러한 레벨은 장기간 투여 동안 일정해 된다. 매우 드물게 혈소판감소증과 무과립구증이 시판후 조사에서 보고되었다. 최초 이 약 투여 12개월 동안 정기적 혈구계산이 권장된다.
- 11) 골격근 : 이 약을 포함한 피브레이트 단독 사용은 근병증이 나타날 수 있다. 일반적으로 신장애 환자에서 피브레이트계 약물의 치료는 드물게 황문근용해증이 나타날 수 있다. 광범위 투여를 포함한 근육약독 또는 약화 그리고 또는 크레아티닌키나아제(CK) 레벨의 현저한 상승이 있는 환자에서 세출증으로 고려해야 한다. 환자에서 특히 권태감 또는 열을 동반하여 상체몰림의 근육통, 약탈 또는 약력이 있는 경우 즉시 이 약을 중단하고 고지혈증 관제해야 한다. 이러한 증상이 나타난 환자는 크레아티닌키나아제(CK) 레벨을 평가해야 하고 현저한 크레아티닌키나아제(CK) 레벨 증가가 나타나거나 근병증으로 진단된 경우 이 약 치료를 중단해야 한다.
- 12) 정맥혈전색전증 질환 : FIELD 임상시험에서, 폐색전(PE) 및 심부정맥혈전증(DVT)이 위약군보다 이 약 치료군에서 잘 발생했다고 관찰되었다.
- 13) 혈청 크레아티닌 : 혈청 크레아티닌 상승이 보고되었다. 이러한 상승은 이 약 치료 중단 후까지 지속될 수 있다. 이러한 관찰의 임상적 중요성은 확인되지 않았다.

5. 상용작용

- 1) 약동학적 상호작용 부재하에서 피브린산 유도제와 HMG-CoA 환원효소저해제의 병용 사용은 황문근용해증, 현저하게 상승된 크레아티닌키나아제(CK) 레벨 및 급성 심부전의 높은 원인이 되는 미오글로빈을 갖는 수많은 사례가 보고되었으므로 HMG-CoA 환원효소저해제(로바스타틴 등)와 병용투여시 황문근용해증의 가능성이 증가할 수 있으므로 주의하고 가능한 병용을 피하는 것이 바람직하다.
- 2) 경구 혈액응고저지제와 병용 : 쿠마린-형 혈액응고저지제를 증상시켜 프로트롬빈시간/INR을 연장시키므로 이 약과 경구 혈액응고저지제를 병용하는 경우 주의해야 한다. 혈액응고저지제의 용량을 출혈 합병증을 방지하는데 요구되는 프로트롬빈시간/INR을 유지할 수 있도록 감량해야 한다. 프로트롬빈시간/INRI 안정화 될 때까지 빈번한 프로트롬빈시간/INR 측정이 권장된다.
- 3) 설포발효제 혈당감화제(에, 글리벳클라미드 등) : 자혈당증(식은망, 관한 공복당, 삼계항진 등)이 나타났다는 보고가 있으며, 병용시, 환자의 상태를 충분히 관찰하여야 투여한다.
- 4) 이 약은 요산배설작용이 있으므로 요산치료제와 병용투여하는 경우에는 용량을 조절하는 등 신중히 투여한다.
- 5) 경구용 피임약(에스트로겐제제)은 혈청 지질농도를 증가시킬 수 있으므로 이 약과 병용투여하는 경우에는 의사와 상의한다.
- 6) 말단신수소제(페닐린, MAO억제제 등) 간독성의 위험이 있는 약물과 병용투여하지 않는다.
- 7) 시클로스포린 : 시클로스포린은 크레아티닌치농도를 감소와 혈청 크레아티닌을 증가시켜 신독성이 나타날 수 있고, 이 약물을 포함한 피브레이트계 약물의 1차 배설 경로가 신장이므로 상호작용이 악화된다는 위험성이 있다. 이 약과 면역억제제 및 다른 잠재적 신독성 약물과의 병용은 유익성과 위험성을 신중히 고려하여 하며 특히 수효용량을 적용해야 한다.
- 8) 면역억제제 중의 정지기산 환자에서 이 약의 병용투여시 드물게 혈청 크레아티닌치 상승을 수반하는 가역적인 신기능 손상이 보고되어 있으므로 이러한 경우에는 신기능을 면밀히 관찰하고 심혈관 검사결과 이상이 확인되면 투여를 중지한다.
- 9) 수지 : 담석상 결핵산치는 동시 투여하면 다른 약물과 결합할 수 있으므로 흡수 방해를 피하기 위해 이 약을 담석상 결핵산치 복용 최소 1시간 전 또는 4~6시간 후에 복용해야 한다.
- 10) 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중(특히 임신 3개월 이후)에 투여시 태아에 축적되어 태아독성을 유발할 위험성이 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는다.
 - 2) 모유수유로의 이행이 알려진 바 없으므로 수유중에는 투여를 피한다(젖에서 유즙으로 이행되었는다고 있다.).
- 11) 소아에 대한 투여
 - 1) 이 약은 소아에게 투여하지 않는다.
- 12) 고령자에 대한 투여
 - 1) 일반적으로 고령자는 간·신기능이 저하되어 있는 경우가 많고, 체중에 적은 경향이 있는 등 이상반응 발현이 쉬우므로 투여 시 주의하여 투여한다. 특히 신기능에 대해서는 투여 중 혈청크레아티닌치를 정기적으로 확인해야 한다.
 - 2) 고령자에서 설포발효제 혈당감화제(글리벳클라미드 등)와의 병용에 의해 지혈당증(식은망, 관한 공복당, 삼계항진 등)이 나타났다는 보고가 있으므로 주의한다.
- 13) 광과민성의 처리
 - 1) 광과 투여에 대한 사례는 보고되지 않았다. 알려진 해독제는 없다. 이 약의 광과 투여시의 증상은 불명확하다. 이 약은 단백질결합률이 높으므로 혈청약물적으로 제거되지 않는다.
- 14) 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
- 15) 기타
 - 1) 설치류에 정기투여시 간종양의 발생이 보고되어 있다.