

데놀 정

위·십이지장궤양치료제
비스무트시트르산염칼륨

【개발경위·개요 및 특징】

소화성궤양 치료제 데놀은 영국의 De-Nol Ltd.를 비롯한 유럽 여러 제약회사의 공동연구에 의해 개발되었으며 오랜 기간 동안 임상상을 통해 그 효과를 인정 받고 현재 세계 30여 개국에서 널리 사용되고 있는 소화성궤양 치료제입니다.
데놀의 주성분인 비스무트시트르산염칼륨은 궤양부위에만 선택적으로 불용성의 보호막을 형성함으로써 위산으로부터 손상된 부위를 보호하여 자연치유를 유도하고, 만성위염과 소화성궤양의 재발 원인인 *Helicobacter pylori*에 대한 항균작용으로 치료율이 높고 재발률이 낮습니다.

【특징】

1. 데놀은 궤양재발의 주원인균인 *H.pylori*에 대한 항균작용을 발휘해 재발률이 낮습니다.
2. 데놀은 궤양부위에 불용성 보호막을 형성하고 Prostaglandin 합성에 관여하여 손상된 위점막세포를 치료합니다.
3. 데놀은 신체 정상기능에 영향을 주지 않아 여성형 유방, 발기부전 등의 염려가 없습니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

유효성분 : 비스무트시트르산염칼륨(KP) 300mg
(산화비스무트(Bi_2O_3)로서 120mg, 칼륨(K)으로서 36mg)
첨가제 (동물유래성분) : 스테아르산마그네슘(소, 우지)
기타 첨가제 : 디메치론, 산화티탄, 옥수수전분, 포라크릴린칼륨(칼륨(K)으로서 5.3 mg), 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로로스

【성상】 원형의 백색 필름 코팅정입니다.

【효능·효과】 위·십이지장궤양

【용법·용량】

성인 : 비스무트시트르산염칼륨으로서 1회 600mg, 1일 2회 아침, 저녁 식전 30분에 경구투여합니다. (깨물어서는 안되며 소량의 물로 삼킵니다.) 또한 1회 300mg, 1일 4회 식전 30분 및 저녁식사후 2시간에 투여할수도 있습니다.
이 약 투여 전후 30분 동안은 음식물이나 음료를 섭취해서는 안됩니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
신장에 환자
2. 부작용
1) 치료초기에 드물게 동통, 구역, 구토, 위장작열감 등이 나타날 수 있습니다.
2) 황화비스마스의 형성에 의하여 대변이 변색 또는 검은색으로 변할 수 있습니다.
3. 상호작용
1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않습니다.
2) 제산제에 의해 효과가 감소될 수 있으므로 이 약 투여 전후 30분 동안에는 제산제를 투여하지 않습니다.
4. 임부에 대한 투여
임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 좋습니다.
5. 수유부에 대한 투여
투약중에는 수유를 하지 않도록 주의합니다.
6. 소아에 대한 투여
소아에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온($1\sim 30^\circ\text{C}$)보관, 열과 광선을 피하십시오.

【포장단위】 30, 60, 480 정

- ※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다.
구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 첨부문서의 작성일자(2017년 7월 24일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.greencross.com)나 소비자상담실 (080-260-8232)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매자

녹십자
GREEN CROSS

충북 음성군 금왕읍 무곡로65번길 26
TEL. 031)260-9300 소비자상담실 TEL. 080-260-8232

설명-10-1106-7