



無 스테로이드 / 無 방부제 / 無 색소

일반의약품
분류번호: 269

기저귀발진

피부개양

욕창

유두균열

덱스파놀

(D-판테놀)

• 원료약품 및 그 분량 1g 중

D-판테놀(USP) 50mg

• 성상 특이한 향이 나는 미황색(연노랑)의 불투명한 연고제

• 효능 · 효과

상처, 화상, 찢긴 상처(수유기 중의 유두균열(갈라짐) 등), 욕창, 급 · 만성 피부염, 습진, 피부개양, 기저귀발진, 햇볕에 탄데(일광(햇볕)피부염)의 보조치료

• 용법 · 용량

- 1) 상처를 청결히 한 후 환부(질한 부위)에 1일 1~2회 바른다.
- 2) 수유기 중의 유두균열(갈라짐)에는 매 수유 직후 유두에 바른다.

• 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 감염성 또는 삼출성 피부병 환자

2. 부작용(이상반응)

드물게 알레르기 피부 반응이 나타날 수 있다.

3. 상호작용

덱스판테놀(D-판테놀)을 근육주사하는 경우

- 1) 덱스판테놀(D-판테놀)의 규라레 길항작용(억제작용)에 의해 규라레양 근육이완제의 효과가 감소된다.
- 2) 염화석시닐콜린의 신경근(신경뿌리) 차단작용이 증강된다.

• 저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

• 포장단위 30g

※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효) 기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.

※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2015. 10. 30

제조사
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821