

소화성 궤양용제

엑사드정 75mg
니자티딘

소화성 궤양용제

일반의약품
분류번호 02320

조제용

엑사드정 75mg

Exad Tab. 75mg

■ 성분·함량 1정중 니자티딘(USP)..... 75mg

첨가제(타르색소) : 황색4호, 황색5호 / (동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

■ 성상 연황색의 장방형 필름코팅정 ■ 효능·효과 속쓰림, 위산과다, 신트림

■ 용법·용량 성인(15 ~ 79세) : 니자티딘으로서 1일 1회 75mg을 경구투여한다.

8시간 경과후에도 증상의 개선이 없을 경우 75mg을 추가로 투여한다. 1일 150mg을 초과할 수 없다.

■ 사용상 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 다른 H₂-수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자(H₂-수용체 길항제에서 고차감수성이 관찰되었다.)
 - 빈혈, 혈소판 감소, 백혈구 감소 등의 진단을 받은 적이 있는 환자
 - 다른 위장약을 복용중인 환자
 - 다음의 치료나 의약품 투여중인 환자: 혈액질환, 간/신질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스 등의 면역질환, 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아세트 항진균제, 5) 15세 미만의 어린이, 6) 80세 이상의 고령자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 말 것)
 - 수유부(동물실험에서 이 약이 유즙중에 분비되는 것으로 알려져 있다.)
 - 이 약은 유당(당) 수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 고용량(3,900mg)의 아스피린(병용투여시 혈청중 살리실산 농도의 증가가 나타났다.)
 - 게피티딘, 프롤리플록사신 또는 아티나자비트(미와)와 같은 약들과 병용투여시 혈중농도가 저하될 우려가 있다.)
 - 다른 위장약(위·십이지장 질환의 치료를 받는 경우 이 약이나 이 약과 비슷한 약이 처방되어 있을 가능성이 높으므로 증복용에 주의해야 할 것.)
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것. - 알코올 음료를 마시는 경우
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 약물과민반응의 병력이 있는 환자
 - 의사의 치료를 받고 있거나 다른 약물을 복용하는 경우
 - 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 경우
 - 65세 이상의 고령자
- 다음과 같은 증상이 있는 환자 :
 - 복의 통증, 기침 또는 고열(이러한 증상이 있는 경우 심각한 감염증이 의심되며 혈구수 감소 등의 혈액 이상이 발견되는 경우가 있다. 복용 전에 이러한 증상이 있을 시 이 약의 복용에 의해 증상이 더욱더 악화되거나 이 약의 이상반응을 늦게 알게될 수 있다.)
 - 원인 불명의 체중감소, 지속적인 복통(다른 병이 원인인 경우가 있다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 과민반응 : 다른 H₂-수용체 길항제와 같이 드물게 발진, 가려움, 기관지천식, 후두부종, 혈압하락, 기관지경련, 인두부종, 호흡곤란, 기타 아나필락시드모양 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 혈액계 : 빈혈이 자주 보고되었으며, 빈혈구감소증, 무구립구중, 과립구감소 때때로 백혈구감소, 호중구증가, 드물게 혈소판감소 자체반, 호산구증가, (치명적) 혈소판감소증이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지한다.
 - 소화기계 : 때때로 변비, 설사, 구갈, 구역, 드물게 복부팽만감 등의 위장장애가 나타날 수 있다. 이러한 증상이 지속되거나 증가되는 경우 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상담한다.
 - 간장 : 때때로 ALT, AST, ALP, γ-GTP 상승 등의 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 드물게 황달을 수반하거나 수반하지 않는 담즙정체 간손상, 간세포 간손상이 보고되었다.

- 정신신경계 : 섬망, 방향감각장애 드물게 가역적인 정신착란, 두통, 졸음, 어지럼, 무력증, 저림 등이 나타날 수 있다. 또한 다른 H₂-수용체 길항제에서 경련이 나타났다는 보고가 있다.
- 순환기계 : 단기간의 무증상 심실성 빈맥이 나타날 수 있다.
- 내분비계 : 드물게 여성형유방증이 나타날 수 있다.
- 피부 : 발한, 두드러기, 발진, 박탈성 피부염이 나타날 수 있다.
- 기타 : 통증 또는 신석증과 관련된 고요산혈증이 나타날 수 있다. 발열, 홍통, 근육통, 비염, 인두염, 기침, 혈관염, 관절통, 혈청병 등이 보고되었다. 드물게 안면부종, 유즙분비가 나타날 수 있다. 다른 H₂-수용체 길항제에서 소크, 간질 신장염, 피부접촉성 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피괴사증(리델증후군), 발성블록 등의 심혈관, 불완전 수축, 황문근 용해증이 보고되어 있다.
- 실수로 정해진 용량을 초과해 복용한 경우
- 3일간 복용해도 증상의 개선이 보이지 않는 경우
- 기타 : 발가부전(외국에서 보고가 있었다.)
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 위암의 증상을 은폐할 수 있으므로 약성이 아닌 것을 확인한 후에 복용할 것.
 - 주로 신장을 통해 배설되므로 중증의 간 또는 신기능이 손상된 환자의 경우 감량 복용할 것.
 - 치료시 경과를 충분히 관찰하면서 치료상 필요한 최소한의 양을 사용하고 효과가 나타나지 않는 경우에는 다른 치료제로 전환한다. 또한 혈액성, 간·신기능 등에 주의할 것.
 - 2주일 이상 계속해서 복용하지 말 것.
 - 정해진 용법용량을 지킬 것.
 - 속쓰림, 위산과다 등의 증상을 피하기 위한 방법은 다음과 같다.
 - 식사후 곧바로 눕지 말 것.
 - 커피인, 초콜렛, 튀김 음식 및 알코올 섭취를 제한하거나 섭취하지 말 것.
 - 취침 직전에 음식을 섭취하지 말 것.
 - 과체중이면 체중을 감량할 것.
 - 흡연량을 줄이거나 담배를 끊을 것.
 - 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 저장방법/사용기간 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월
- 포장단위 자사기준

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하여 제조된 K.G.M.인증업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정일자: 2014.01.09