




주



주성분 :

안정제 :

pH조정제

용제 :

전해질(m

【성상】

【작 용】

부지(

- 【효능·효과】

급·만성 간장애에 의한 뇌증의 개선, 간장애 환자의 아미노산 보급

【영양 · 영양】

- 성인 : 총 아미노산으로서 1일 체중 kg당 1~1.5g을 최대용량으로 정맥내 점적주시합니다.
- 투여속도 : 60분간에 총 아미노산으로서 10g정도의 농도가 바람직하며, 1분간 30~40적을 점적 주사함을 원칙으로 합니다.
- 소아, 고령자, 단백요구량이 많은 화상환자 등의 경우는 용량 및 주입속도를 적절히 조절하여 투여하여야 합니다.

【사용상의 주의사항】

- ## 1. 경고

- 반드시 의사의 지시에 의하여 사용하십시오.**
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
- 1) 중증 신장장애 환자, 고질소혈증 환자
 - 2) 간장애 이외의 아마노산 대사 이상이 있는 환자
 - 3) 질소이용을 저해하는 대사 장애 환자
 - 4) 소모성 심부전증 환자
 - 5) 폐부종 환자
 - 6) 핏트증, 무뇨증 환자

- 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 의약품(수입의약품 포함) 등은 약국 등의 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 당사 영업시원을 통하여 교환하여 드립니다.
- 이 첨부문서 작성(가정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skpharma.com)나 제품상담 전용 전화를 통하여 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '이지드렉(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보'를 참조하십시오.

1994. 8. 26. 작성
※2012. 3. 28. 개정
(Ver.002)

- ## 11. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 소프트백의 경우, 통기침은 필요하지 않습니다.

2) 바이알 제품의 경우 환기관이 없으므로, 액이 새는 것을 막기 위해서 통기침을 점적 개시 직전에 끼웁니다.

3) 약액의 착색을 방지하기 위해 포장을 사용할 때까지 개봉하지 않습니다.

4) 약액이 착색, 누출되었거나 포장중에 물방울이 나타나는 경우에는 사용하지 않습니다.

5) 고무마개를 보호하는 필름이 벗겨졌을 경우에는 사용하지 않습니다.
6) 용기의 눈금을 기준으로 사용합니다.

【저장방법】 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 직접용기에 별도표기

【포장단위】 100mL, 250mL

◆ Bag제품 사용할 때의 주의사항


1. 용기에 인쇄된 용량 표시 눈금과 실제용량이 다를 수도 있습니다.
2. 용기의 겔포장 필름은 사용전까지 제거하지 마십시오. 겔포장 필름을 제거하였을 때는 용기를 눌러서 누액 등의 손상여부를 확인하십시오.
3. 손상(누액)이 확인된 용기는 사용하지 마십시오.
4. 개봉시의 냄새는 아미노산 고유의 특성이므로 제품의 이상여부와는 관계가 없습니다.

◆ 수액제품 사용시 주의사항

1. 주사기나 수액set 삽입부위를 알코올 등으로 충분히 소독 후 사용하십시오.
2. 멸균한 주사기나 수액set을 사용하여 점적 정주하십시오.
3. 확대하지 않고 쉽게 알아볼 수 있는 흔적물이나 불용성 물질이 있으면 사용하지 마십시오.

◆ 혼주시 주의사항

1. 혼주할 경우에는 고무전 파편이 발생할 우려가 있으므로 21gage보다 직경이 작은 needle을 사용하시는 것이 좋습니다.
2. 고무전은 대한약전의 수액용 고무전 시험법에 합격한 것으로 고무전 파편이 발생하여도 유해 성분이 용출되지 않습니다.
(고무전파편은 수액 세트 내 여과망에 의하여 걸리므로 인체에 유입될 가능성이 희박합니다.)



제품상담 전용전화(무료) : 080-969-9966 자세한 문의는 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

ASDB091-1203-002