

일반의약품 정보		일반의약품 정보 (계속 됨)	일반의약품 정보 (계속 됨)
[유효성분] 이 약 1정 (682 mg) 중 • 아세트아미노펜 (KP) 300.0 mg • 클로록사존 (KP) 250.0 mg [효능·효과] 신경통, 근육통, 관절통, 요(허리)통, 염좌통(뻥 통증), 건 통 (어깨걸림, 어깨동증), 근경련(근육경련), 근경직 등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제질환(여러질환) [용법·용량] 성인: 1회 2정 1일 4회까지 공복 (빈 속) 시를 피하여 복용하 십시오. 연렐(나이), 중상에 따라 적절한 증감하십시오. [사용상의 주의사항] 1. 경고: 매일 제한 이상 정기적으로 술을 마시는 사람 이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반 드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것. 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량 (4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으 므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용 해서는 안 된다. 3. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 클로록사 →		3. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 클로록사 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자 3) 지금까지 이 약에 의한 과민증성예를 들면, 발진, 발적 (종출되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기) (후두, 눈꺼풀, 입 술 등)을 일으킨 적이 있는 사람 4) 지금까지 이 약 보 는 다른 감각, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람 4. 복용시 주의사항 1) 이 약의 복용에 의해 다음에 다음 과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같 은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것. • 이 약의 복용 후 곧바로 두드 러기, 부종(부기) (후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등 과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은 땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우 • 고열을 수반하여 발 진, 발적(종출되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우 • 천 식이 나타난 경우 2) 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과광투여의 간독성을 증가시킬 수 있다. 5. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 심한 간, 신장에 (신장장애) 환자 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기 가 있었던 환자 →	6. 부작용 1) 과민증: 두드러기, 발적(종출되어 붉어짐), 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지한다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈(출혈점), 반상출 혈(피부에 검보랏빛 얼룩점이 생기는 내부출혈), 오변색 (소변색이 변함) 등이 나타날 수 있다. 매우 드물게 혈관 신경성 부종(부기) 또는 아나필락시스(중상)이 나타날 수 있다. 2) 간장: 클로록사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지한다. 3) 소화기: 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있다. 4) 정신신경계: 때때로 졸 음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있다. 7. 임부에 대한 투여 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신과 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다 고 판단되는 경우 투여한다. 8. 상호작용 알코올이나 중추신경억제제와 병용(함께 복용)투여시 삼각작용이 나타나므로 신중히 투여한다. (성 상) 환상·미환색(연노랑)의 징후를 필름코팅제 [저장방법 및 사용기간] • 밀폐용기 • 실온(1~30℃) 보관 • 제조일로부터 36개월 (제조번호 및 사용기한) 별도 표기 ※ 개정일: 2022. 07. 04 ↓

[참가제] 미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 옥수수전분, 미결정셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탈수드클레이(90333), 히드록시프로필셀룰로오스		* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. (구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.) * 본 제품에 대한 의문사항은 당사 소비자 상담실 031-319-1973로	문의하십시오. * 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국약품안전관리원 에 피해구제 신청을 할 수 있습니다. ☎ 14-3330 : 피해구제 상담 ☎ 1644-6223 : 의약품 부작용 신고·피해구제 상담 * 제조판매처: 동인당제약주식회사 / 경기도 시흥시 경계로59
---	--	---	---

의약품 안전용기포장

일반의약품 | 분류번호 : 01140

진통+근육 이완 복합 처방

클라펜 정

- 신경통
- 요 통
- 근육통
- 관절통
- 염좌통

※ 제품개봉시 포장지에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

10 정