

## 일반의약품

■원료약품의 분량 100mL 중  
아이비엽70%에탄올유동엑스(생규) ... 2g  
(헤데라코시드C로서 40mg)  
첨가제(보존제): 소르빈산칼륨(NF) ... 0.2g

■성상 오렌지향이 있는 갈색의 시럽제

■효능·효과  
만성 염증성 기관지 질환의 증상 개선,  
기침을 동반한 호흡기의 급성 염증 완화

■용법·용량

성인 및 15세 이상 : 아이비엽70%에탄올  
유동엑스로서 1회 100mg을 1일 3회 복용  
한다. 4~14세 : 이 약으로서 1회 100mg을  
1일 2회 복용한다. 2~3세 : 이 약으로서  
1회 50mg을 1일 3회 복용한다.

■저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

■제조사 : 한국콜마(주) /  
세종특별자치시 전의면 산단길 245

■제조의뢰자 : 영풍제약(주) /  
인천광역시 남동구 함박외로 333

■본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며,  
만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패  
또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여  
교환하여 드립니다.

■개정연월 이후 변경된 내용은 온라인의약도서관  
(<http://drug.mfds.go.kr>)의 제품정보를 통해 확인  
하실 수 있습니다.

## 직사광주의

조제용

500mL

분류번호 : 222

안전한 진해·거담제

# 푸로델 시럽

## PRODEL Syrup

아이비엽70%에탄올유동엑스

제조번호 :

사용기한 :



제조의뢰 · 판매자  
**영풍제약주식회사**  
인천광역시 남동구 함박외로 333



## ■사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에  
과민반응 환자 2) 과당불내성 환자(감미제로 소르비톨 또는 과당 성분을 함유하  
고 있음.) 3) 입부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임부의 투여에 관한  
안전성이 확립되어 있지 않다.) 4) 수유부(수유부의 투여에 관한 안전성이 확립  
되어 있지 않다.) 2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과  
의사, 약사와 상의할 것. 1) 위염 또는 위궤양 환자 2) 2세 미만의 영·유아의사  
의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다.  
2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터  
해야 한다.) 3) 코데인 또는 엑스트로베르돈 등 다른 진해거담제가 함유된 제제  
와 병용 투여시 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사,  
약사와 상의할 것. 심담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것. 이상반응 발현빈도  
는 드물게(0.01%≤, <0.1%), 매우 드물게(0.01% 미만)로 구분하였다. 1) 이 약  
의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1) 소화기계 : 드물게 설사, 구역 혹은  
구토가 나타날 수 있다. (2) 피부 : 매우 드물게 켜켜부종, 발적(충혈되어 붉어짐),  
가려움, 두드러기가 나타날 수 있다. (3) 호흡기계 : 매우 드물게 호흡곤란이 나  
타날 수 있다. (4) 기타 : 발열, 고열(가래가 나타날 수 있다.) 5. 시판후 조사 결과 :  
① 국내에서 재삼사를 위하여 6년 동안 651명을 대상으로 실시한 시판후 조사결  
과 이상반응의 발현(드러냄) 빈도율은 0.46%(3명/651명)였으며, 복용(배아름)  
2건, 복부팽만감, 구역, 구토, 어지러움이 각 1건씩 보고되었다. ② 외국에서  
실시된 9,657명의 시판후 조사 결과 아이비엽제제와 항생제/화학요법제 병용(함  
께 사용)시 이상반응이 발현(드러냄) 빈도율이 26%, 항생제 이외의 약제와 병용  
(함께 사용)시 아이비엽 단독 사용에 비해 이상반응 발현(드러냄) 빈도율이 2배로  
나타나 상대적으로 이상반응 위험이 증가된다는 보고가 있다. 시판 후 조사결과  
이상반응은 주로 소화기계 이상으로, 경증(가벼운 증상)이었으며 일시적이었다.  
이상반응으로 인해 46명(0.5%)이 치료를 중단하였으며, 이상반응은 주로 소화  
기계(18명 설사)에 의한 것이었다. 2) 1주일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을  
경우 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항) 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜라. 2)  
2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하여 복용시킬 것. 또한,  
이상반응의 발현빈도와 발현부위에 대한 조사가 없었으므로 10세 미만 어린이가  
복용할 경우 주의하게 모니터해야 한다(소아의 용법·용량이 미정인 제제에 한함.).  
5. 저장상의 주의사항) 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관  
할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).



HDPE  
캡:PP

개정연월 : 2013. 12

제품문의 032-812-8356