

근친화성 위장관운동 정상화제

티로스 타 정

(티로프라미드염산염)

티로스타정은 위장관 평활근 조절인자인 c-AMP의 생성을 촉진시키며 칼슘이온량을 조절하여 평활근의 근육이 과도하게 수축하여 발생하는 경련과 통증을 신속하게 완화시켜 줍니다. 또한 티로스타정은 기존의 진경제와는 달리 위장관 운동을 마비시키지 않아 위장기능을 손상시키지 않으며, 인체에 무해한 천연 아미노산 Tyrosine 유도체로 부작용이 거의 없는 안전한 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
티로프라미드염산염(별규) 100mg
첨가제(부형제) : 유당수화물(소의 우유)

【성 상】 흰색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 통통 : 간담도 산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 통통 : 위장관 이상운동증, 담석증, 담낭염, 수술후 유착

【용법·용량】

성인 : 티로프라미드염산염으로서 1회 100mg 1일 2~3회 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
 - 2) 거대 결장, 허탈 환자
 - 3) 이 약에 과민증 환자
 - 4) 중증의 간부전 환자
 - 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선비대 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응
 - 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지 한다.
4. 상호작용
혈압강화약물을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강화 효과가 상승될 수 있으므로 주의 한다.
5. 임부에 대한 투여
동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여한다.
6. 보관 및 취급상의 주의사항.
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30, 500정

- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)→「정보마당」→「의약품등 정보」를 참조하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 대표전화 : 02-2672-1122 제품문의 : 080-655-1414 홈페이지 : www.guju.co.kr
- ※ 제조자 : 구주제약(주) 경기도 화성시 정남면 덕절제길 5

설명서 문안 최종 개정연월일 : 2016. 5. 4

I-1601