

의약품 분류번호	231 치과 구강용약
-------------	-------------------



일반의약품

원료약품의 분량

1캡슐 중 제피아스코르빈(별규).....153.846mg (아스코르브산으로서 150mg) 염화리소짐(KP).....30.0mg
카르바조콜(KP).....2.0mg 토코페롤아세테이트 2배산(KP).....10.0mg (토코페롤아세테이트로서 5mg)

성상

주황색의 가루가 든 상하부 파란색의 경질캡슐

효능·효과

치은염(잇몸염), 치조(이빨)농루에 의한 여러증상(잇몸의 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 출혈, 통증)의 완화

용법·용량

성인 1회 1캡슐 1일 3회 식후에 복용하십시오.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

① 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자 ② 다른 약물을 투여받고 있는 환자 ③ 지금까지 약이나 말갈에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose - galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 부작용

① 이 약을 투여함으로써 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염(입안염) 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사(치과의사)와 상의하십시오. ② 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리델 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반(붉은반점), 가려움, 안충혈, 구내염(입안염) 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상양(불에 덴 듯한 모양)의 수종 등의 중증(심한 증상)의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와같은 중증(심한 증상)의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

4. 일반적 주의

① 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. ② 1개월이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

① 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. ② 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관하십시오. ③ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

자사포장단위

교환 및 제품문의

이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 대한 문의사항이 있으시면 연락하십시오. 연락처: 고객센터 1588-2675



첨부문서 작성년월일: 2015. 1. 19 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조판매원

JW 중의제약
제이더블유중의제약(주)
충남 당진시 송악읍 한진길 56

덴드리스캡슐사-1503-J