

피로회복 · 비타민보급
파워폴 연질캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

니코틴산아미드(KP)	20mg
리보플라빈(KP)	3mg
아스코르브산(KP)	75mg
티아민염산염(KP)	2mg
농축콜레칼시페롤과립(EP)	4mg
레티놀팔미테이트(KP)	5,000IU
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	0.12mg
첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호, 황색203호	

[효능 · 효과]

다음 경우의 비타민 A, D, B₁, B₂, C 의 보급 :

- 육체피로, 임신수유기, 병중병후의 체력저하시, 발육기 및 노년기
- 눈의 건조감의 완화
- 야맹증(밤에 잘 못보는 현상)
- 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

[성 상] 황갈색의 내용물이 충전된 적갈색의 장방형 연질캡슐제

[용법 · 용량] 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용

[사용상 주의사항]

- 경고
(1) 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민A결핍증 환자는 제외).
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
(1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
(2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
(3) 만3개월 미만의 젖먹이
(4) 신장결석 환자
(5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
(6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
(2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
(3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생)증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
② 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
(4) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
(5) 신장결석 병력이 있는 환자
(6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 제2형 당뇨병 등 지방대사 이상 환자 또는 지질제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
: 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 묽은 변
(2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
(3) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
(4) 장기간 고용량의 비타민A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양증) 위험을 높일 수 있다.

- 우발적으로 과량복용 한 경우
(1) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
(1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
(2) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급 되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다.
(3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
(4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
(5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 저장상의 주의사항
(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 1C, 600C

- ※ 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 대표전화 : 02-2672-1122
- ※ 제품문의 : 080-655-1414
- ※ 홈페이지 : www.gujup.co.kr
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 참조하시기 바랍니다.
- ※ 제조의뢰자 : 구주제약(주) 경기도 화성시 정남면 덕절제길 5
- ※ 제조자 : 골파파(주) 충북 제천시 바이오밸리2로 93