

● 성분·함량: 1정 중

제피아스코르빈산(KPC).....625mg
(아스코르빈산으로서 600mg)
50%초산토코페롤(KPC).....60mg
(초산토코페롤로서 30 I.U.)
티아민질산염(KP).....24.76mg
리보플라빈(KP).....10mg
니코틴아미드(KP).....100mg
판토텐산칼슘(KP).....30mg
파리독신염산염(KP).....6.07mg

폴산(KP).....400μg
0.1%시아노코발라민(KPC).....12mg
(시아노코발라민으로서 12μg)
비오틴(USP).....45μg
황산아연(USP).....65.58mg
(아연으로서 23.9mg)
무수황산동(BP).....3.75mg
(구리로서 3mg)

첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호(알루미늄레이크), 황색5호(알루미늄레이크)

● 성상: 갈색의 장방형 필름코팅정

● 효능·효과 - 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C, E의 보급
육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하, 노년기, 아연의 보급
이약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등) / 각기 / 눈의피로 /
햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화 / 잇몸출혈·비출혈 예방

● 용법·용량: 성인 1회 1정, 1일 1회 식후복용

● 저장방법: 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과
되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판
매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해
결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.



일반의약품
60정

비타민C 600mg함유 고단위 종합비타민제

육체피로/체력저하/아연 보급

◆ 아연의 효능 ◆

· 면역력을 증가시켜 감염으로부터 인체를 보호합니다.

· 건강한 피부를 유지하고, 집중력을 향상시킵니다.

테라빅 정



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4

소비자상담실: 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실: 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

【사용상의 주의사항】 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 2) 12개월 미만의 영아 3) 월산씨병 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분 해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유 전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오(복용전 의사 또는 약사와 상의하 십시오) 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 과산화증환자(hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 3) 임 부, 수유부 4) 심장·순환기계기능 장애 환자 5) 신장에 환자 6) 저단백혈증 환자 3. 부작용 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. · 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, · 묽은변, · 상복부 통증, 혼수, · 위장관장애, 소화장애, 저혈압, 폐부종 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거 나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다. 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여 성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민을 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다. 4) 장기간 고용량을 투여 할 경우 내성이 생길 수 있습니다. 5) 파리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화) 나타날 수 있습니다. 6) 염산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태) 간장상을 일으킬 수 있습니다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈 증, 울혈성심부전 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 4. 일반적 주의 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오. 5. 상호작용 1) 항알도스테로제, 트리암테렌 과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다. 가) 인산염 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제 나 레보도파 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오 6. 임상검사에의 영향 1) 각종 요검사에 해당의 검출을 방해할 수 있습니다. 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다. 7. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하 십시오 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

제조번호:

사용기한:

개정연월일: 2009.11.07

P0910-01