

덴소자임에프캡셀

[원료약품 및 그 분량] 1정(391mg) 중

염화리스장(KPC)	30.0mg(약가)
제피아스코르빈산(KPC)	156.25mg
(아스코르빈산으로서 150mg)	
건조초산토포페롤50%TYPE SD(별규)	60.0 mg
(초산토포페롤으로서 30IU)	
동클로로필린나트륨(KPC)	20.0mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물(기완소, 사용부위유유)	

[성상] 짙은 청록색의 분말이 든 상·하부 연녹색의 경질캡셀제

[효능·효과]

치은염·치조농루에 의한 여러 증상 (잇몸의 발적·부기·출혈·고름 등)의 완화

[용법·용량]

성인 1회 1캡셀, 1일 3회 식후복용

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
 - 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
 - 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 이상반응
 - 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
 - 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부접막안증후군), 리얼증후군(중독성표피괴괴시증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열·홍반·가려움·인출혈·구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적·화상양의 수증 등의 증상의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 의사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 증상의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법 용량을 잘 지키다.
 - 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
 - 이 약은 14세 이하의 소아에게 투여하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고, 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.
 - 오용을 막고 품질의 보존을 위해서 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 자사포장단위

- * 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 본 제품은 재정경제부 고시 소비자 피해보상 규정에 의거, 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- * 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자 상담실(080-001-0795)에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2009년 04월 24일

제조원 :



BioPharmaceutical Organization

주비티오제약

경기도 이천시 부발읍 가산리 491-7
소비자 상담실 : 080-001-0795