



위통, 복통, 위산과다, 가슴앓이 스파로민정

【원료약품 및 그 분량】 1정(190mg) 중

디사이클로민염산염(BP)..... 5mg

파파베린염산염(KP) 15mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원 : 소, 사용부위 : 우유)

【성상】

백색의 원형정제

【효능·효과】

위통, 복통, 위산과다, 가슴앓이

【용법·용량】

보통 성인 : 1회 2정씩 1일 2~3회 8~14세 : 1회 1정씩 1일 2~3

회, 식후 또는 식간 복용

단, 1일 2회이상 사용시 4시간 이상의 간격을 두고 복용함.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 위장관의 폐쇄증, 마비성 장폐쇄증, 장아토니, 급성출혈로 인한 심장혈관 부전증, 중증궤양성 대장염 및 이에 합병된 거대결장, 중증성 근무력증

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이상반응

두통, 현기, 불면증, 졸음, 과도한 진전, 식욕부진, 복부팽만감, 구역, 구토, 변비, 설사, 시야몽롱, 배뇨곤란, 피부발진, 안면홍조, 이상고열, 모양근마비, 심계항진, 호흡깊이의 증가, 경미한 혈압상승, 박동 수 증가, 권태, 발한, 전신불쾌감

3. 일반적 주의

1) 녹내장 및 전립선 비대증환자에는 주의하여 투여할 것.

2) 갑상선 기능항진증, 관상동맥성 심장병, 울혈성심부전, 부정맥, 고혈압증에는 주의하여 투여할 것.

3) 과민증을 포함한 약물 특이체질환자에는 주의하여 투여할 것.

4) 자율신경질환, 간장질환, 궤양성대장염이 있는 환자에게는 주의하여 투여할 것.

5) 자동차운전 등 위험한 기계의 조작 등에 종사할 때에는 주의하여 투여할 것.

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】

제조일로부터 36개월

【포장단위】

자사포장단위

【날달모음포장(PTP)의 제조번호 및 사용기한 보는 법】

예를 들어 "1001 130101"로 표기된 경우, 앞 네자리 "1001"은 제조번호, 뒤 여섯자리 "130101"은 사용기한 "2013년 1월 1일"을 각각 의미함.

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 재정경제부 고시 소비자 피해 보상 규정에 의거, 구입하신 약국에서 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(☎080-001-0795) 또는 식약청 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr)사이트의 의약품 정보란에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2010년 09월 17일

제조원



주비티오제약

경기도 이천시 부발읍 가산리 491-7
소비자 상담실 : 080-001-0795
www.biopharm.com

판매원



종근당

계열회사 경보제약
충남 아산시 삼육동 345-6