

전문의약품	분류번호: 629
--------------	-----------

피부진균증 · 칸디다감염증 치료제

티나졸 캡슐(플루코나졸)

Tinazole Cap.(fluconazole)

■원료약품 및 그 분량 : 1캡슐 중

플루코나졸(USP) 50.0mg

첨가제(타르색소) : 청색1호

■성 상 : 백색 내지 유백색의 분말을 함유하는 상부청색, 하부백색의 경질캡슐제

■약리작용

1. 강력한 항진균작용

티나졸캡슐은 triazole계의 항진균제로서 진균의 Ergosterol합성을 선택적으로 저해하여 in vivo에서 보다 탁월한 감수성을 나타내는 항진균제입니다.

2. 뛰어난 안전성

티나졸캡슐은 간독성 발현의 위험이 적은 안전한 약제입니다.

3. 간편한 복용법

티나졸캡슐 질칸디다증의 경우 1회 치료요법으로 가능하며, 그 외 모든 진균감염증치료에 1일 1회 1캡슐 또는 1주 1회 3캡슐 투여가 가능합니다.

■효능 · 효과

1. 균역 또는 정상성 질칸디다증

2. 면역기능이 저상인 환자 및 면역기능저하 환자의 구강 인두, 식도, 비참습성 기관지 폐감염과 칸디다노증, 피부점막 및 만성위궤성 구강칸디다증(외치로 인한 구강내 통증)등을 포함한 점막 칸디다증

3. 칸디다혈증, 파중성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증

4. 면역기능이 정상인 환자 및 면역기능저하 환자(에이즈(AIDS), 장기이식 환자 또는 그 밖의 다른 면역억제요법을 받는 환자 등)의 크립토콕쿠스 수막염 및 폐, 피부 등 신체 다른 부위의 크립토콕 쿠스증

5. AIDS 환자의 크립토콕쿠스증의 재발을 방지하기 위한 유지요법

6. 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구감소증으로 인해 진균감염의 위험이 있는 면역기능저하 환자의 진균감염증 예방

7. 손 · 발톱진균증, 무좀(족부백선), 체부백선, 원선(살색선), 어루러기 및 피부칸디다증을 포함한 피부진균감염증

■용법 · 용량

약물투여경로는 환자의 임상상태에 따라 결정합니다.

경구제제의 흡수는 빠르고 거의 완전하게 흡수되므로, 경구제제(캡슐, 건조시립)와 주사제제의 투여 량은 같습니다.

○ 성인

1. 질칸디다증 : 플루코나졸로서 150mg 단회 경구투여

2. 점막 칸디다증

1) 구강 인두 칸디다증 : 이 약으로서 보통 1일 1회 50mg을 7~14일간 투여하며 의사의 판단에 따라 연장 투여할 수 있습니다.

2) 만성 위궤성 구강칸디다증(외치로 인한 구강 내 통증) : 이 약으로서 보통 1일 1회 50mg을 14일간 투여하여 외치의 국소 소독을 병행해야 합니다.

3) 기타 점막 칸디다증 (질칸디다증을 제외한 식도칸디다증, 비참습성 기관지 폐감염증, 칸디다노 증, 피부 점막 칸디다증 등) : 이 약으로서 보통 1일 1회 50 mg을 14~30일간 투여하며 난치성 점막 칸디다증의 경우에는 1일 100mg으로 증량할 수 있습니다.

3. 칸디다혈증, 파중성 칸디다증 및 그 외의 침습성 칸디다 감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신칸디다증 : 이 약으로서 보통 첫날 400mg을 1회 투여하고 다음날부터 1일 1회 200mg을 투여하며, 환자의 반응에 따라 1일 400mg까지 증량할 수 있습니다. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정합니다.

4. 크립토콕쿠스 수막염 및 다른 부위의 크립토콕쿠스증 : 이 약으로서 보통 첫날 400mg을 1회 투여하고 다음날부터 1일 1회 200 ~ 400mg을 투여합니다. 치료기간은 임상반응 및 진균학 적 반응에 의해 결정되나 보통 최소한 6 ~ 8주간 투여해야 합니다.

5. AIDS 환자의 크립토콕쿠스 수막염 재발 방지를 위해서는 환자가 기초 치료를 모두 받은 후 이 약으로서 1일 1회씩 최소한 100mg을 무기한 투여합니다.

6. 세포독성화학요법이나 방사선요법, 골수이식으로 인한 호중구 감소증으로 인해 진균 감염증의 위험이 있는 면역부전 환자의 진균 감염증 예방 : 환자의 진균 감염증에 걸릴 위험정도에 따라 이 약으 로서 1일 50~ 400mg을 투여하여야 합니다. 전신성 진균 감염증의 위험이 매우 높은 환자, 즉 골수이식의 경우와 같이 호중구 감소증이 심하거나 호중구 감소증 기간이 길 것으로 예상되는 환자에 게는 1일 400mg을 권장합니다. 이러한 환자에게는 호중구 감소증이 시작되라고 예상되는 5~6 일전부터 400mg을 투여하여야 하며 호중구가 1,000 cells/mm3이상으로 증가된 후에도 1주일 동안 계속 400mg 을 투여하여야 합니다.

7. 손 · 발톱진균증에는 1주 1회 150mg씩 투여하며, 투여기간은 손, 발톱이 다시 자랄 때까지(감염 되지 않은 새로운 손, 발톱이 자랄 때까지) 투여합니다. 새로운 손톱이 자라는데 걸리는 기간은 보통 3~6개월, 발톱의 경우 6~12개월 정도 걸리며 성장속도는 개인별로 연령에 따라 다를 수 있습니다. 장기간 투여로 성공적으로 치료한 후 때때로 손, 발톱이 손상된 채로 있는 경우도 있습니다.

무좀(족부백선), 체부백선, 원선(살색선), 피부칸디다증을 포함한 피부 진균감염증 : 이 약으로서 보통 1일 1회 50 mg 또는 1주 1회 150 mg을 2~4주간 투여합니다. 그러나 무좀의 경우 경구에 따라 6주간 투여가 필요할 수도 있습니다. 어루러기는 1일 1회 50mg을 2~4주간 투여합니다.

○ 소아

성인용량에 근거한 소아용량은 일반적으로 다음과 같은 기준을 적용하며, 최대 400mg을 초과하지 않습니다.

성인용량	소아용량
100mg	3mg/kg
200mg	6mg/kg
400mg	12mg/kg

단, 생후 6개월 미만의 영아에 대한 안전성, 유효성이 확립되어 있지 않습니다(사용상의 주의사항 참조).

1. 구강 인두 칸디다증 : 이 약으로서 첫날 체중 kg당 6mg을 투여하고, 다음날부터 1일 체중 kg당 3mg을 투여합니다. 재발방지를 위해 최소 2주간 투여해야 합니다.

2. 식도 칸디다증 : 이 약으로서 첫날 체중 kg당 6mg이며, 다음날부터는 1일 체중 kg당 3mg을 투여합니다. 환자의 반응에 따라 1일 12mg까지 증량할 수 있습니다. 최소 3주간, 증상 소실 후 적어도 2주간 투여합니다.

3. 칸디다혈증, 파중성 칸디다증 및 그 외의 다른 침습성 칸디다 감염증(복막, 심내막, 폐, 비뇨기계 등)을 포함한 전신 칸디다증 : 1일 체중 kg당 6~12mg의 용량을 투여합니다. 투여기간은 임상적 반응 및 의학적 판단에 따라 결정합니다.

4. 크립토콕쿠스 수막염 ~ 이 약으로서 첫날 체중 kg당 12mg을 투여하고, 다음날부터 1일 체중 kg당 6mg을 투여합니다. 환자의 반응에 따라 1일 체중 kg당 12mg으로 증량할 수 있습니다. 치료기간은 뇌척수액 배양 음성 소견이 있는 후 10~12주간 동안 투여합니다.

5. AIDS 환자의 크립토콕쿠스 수막염의 재발방지를 위해서는 환자가 기초치료를 모두 받은 후 1일 1회 체중 kg당 6mg을 투여합니다.

6. 신장에 소아는 신장장애의 정도에 따라 성인 신장에 환자와 동일한 기준으로 투여간격을 늘리고 용량을 줄여야 합니다.

10mg 미만의 용량을 투여할 때는 정확한 양을 맞추기 위해 소아의 임상적 상태에 따라 시럽제를 경구투여하거나, 주사제를 정맥주사 하여야 합니다.

5. 상호작용

이 약과 다른 약물을 병용투여하지 않습니다.

- ▶ 시사프라이드 : 이 약과 시사프라이드 병용투여 시 Torsade de Pointes를 포함한 심혈관계 이상반응이 보고되었습니다. 이 약(200mg씩 1일 1회 투여)과 시사프라이드(20mg씩 1일 4회 투여) 병용투여 한 통제된 임상시험에서 시사프라이드의 혈장농도 증가 및 QTc 간격 연장이 나타났습니다. 따라서 이 약과 시사프라이드를 병용투여하지 않습니다.
- ▶ 테르페나딘 : 테르페나딘과 함께 이출제 항진균제를 투여 받는 환자에서서 QTc간격 연장에 따르는 중증 심부정맥이 발생되었으며, 약물상호작용시험이 수행되었습니다. 이 약을 1일 200mg 투여 한 시험은 QTc 간격 연장을 입증하지 못했습니다. 또 다른 시험(이 약 1일 400mg, 1일 800mg 투여)은 테르페나딘을 병용 시 이 약 1일 400mg 또는 그 이상 용량 의 투여가 테르페나딘의 혈중 농도를 상당히 증가시킴을 보였습니다. 이 약 400mg 또는 그 이상의 용량과 테르페나딘을 병용투여하지 않습니다.
- ▶ 아스테미졸 : 이 약과 아스테미졸의 병용은 아스테미졸의 청소율을 감소시킬 수 있습니다. 아스테미졸의 혈장농도의 증가는 QT연장 및 드물게 torsade de pointes를 일으킬 수 있습니다. 이 약과 아스테미졸을 병용투여하지 않습니다.
- ▶ 피모짓 : in vivo 및 in vitro 시험은 실시되지 않았으나, 이 약과 피모짓의 병용투여가 피모 짓의 대사억제를 유발시킬 수 있습니다. 증가된 피모짓 혈장농도는 QT연장 및 드물게 torsades de pointes를 일으킬 수 있습니다. 이 약과 피모짓은 병용투여하지 않습니다.
- ▶ 퀴나딘 : in vivo 및 in vitro 시험은 실시되지 않았으나, 이 약과 퀴나딘의 병용투여는 퀴나딘 의 대사억제를 유발시킬 수 있습니다. 퀴나딘의 투여는 QT 연장과 드물게 torsades de pointes의 발생과 관련 있습니다. 이 약과 퀴나딘은 병용투여하지 않습니다.
- ▶ 에리트로마이신 : 이 약과 에리트로마이신의 병용은 심독성(QT간격 연장, torsades de pointes) 및 그에 따른 급성 심정지 위험 증가시킬 가능성이 있습니다. 이 약과 에리트로마 이신은 병용투여하지 않습니다.

이 약과 다른 약물을 병용투여 시 신중투여 및 용량조절이 고려됩니다.

- 다른 약물이 플루코나졸에 미치는 영향
 - ▶ 히드로콜로로치아짓 : 건강한 지원자를 대상으로 한 약물동력학적 상호작용시험에서 이 약과 다회용량의 히드로콜로로치아짓을 병용투여 시, 이 약의 혈장 농도가 40%까지 감소하였습 니다. 이 정도 수준의 영향으로, 이노제제를 병용하는 환자에서 이 약의 투여량 조절은 필요 하지 않습니다.
 - ▶ 리팜피신 : 이 약과 리팜피신을 병용투여 시 이 약의 AUC가 25% 감소하고 반감기가 20% 짧아졌습니다. 그러므로 리팜피신과 병용 시 이 약의 중량을 고려해야 합니다.
- 플루코나졸이 다른 약물에 미치는 영향
 - ▶ 이 약은 강력한 CYP2C9억제제 및 중등도의 CYP3A4억제제입니다. 아래 언급한 관찰되고/임증된 상호작용뿐만 아니라, 이 약을 병용투여 시 CYP2C9과 CYP3A4에 의하여 대사되는 다른 약물들의 혈장 농도가 증가되는 위험성이 있습니다. 따라서 아래 약물들과 병용 투여 시 신중 함이 요구되며, 환자를 주의하여 모니터링 해야 합니다. 이 약의 긴 반감기 때문에 치료 중단 후에도 플루코나졸의 효소억제효과는 4~5일간 지속됩니다.
 - ▶ 알펜타닐 : 이 약과 알펜타닐을 병용투여 한 시험에서 알펜타닐의 반감기 증가 및 청소율과 분포용량의 감소가 관찰되었습니다. 이 같은 작용의 가능성은 이 약의 CYP3A4억제에 있습 니다. 알펜타닐의 용량조절이 필요할 수 있습니다.
 - ▶ 아미트리프틸린, 노르트리프틸린 : 이 약은 아미트리프틸린과 노르트리프틸린의 효과를 증가 시킵니다. 이 약과 병용치료 시작 시점 및 일주일 후, 5~노르트리프틸린/5~아미트리프틸린이 축적될 수 있습니다. 필요시 아미트리프틸린/노르트리프틸린의 용량이 조절되어야 합니다.
 - ▶ 알프로테린 B : 감염증상태의 정상 마우스와 면역이 억제된 마우스를 대상으로 이 약과 알프로 테린 B를 동시 투여했을 때 다음과 같은 결과를 보였습니다. : C, albican에 의한 전신감염 에서는 항진균효과가 약간 더 관찰되었음, Cryptococcusneoformans에 의한 두개내감염 에서는 약물상호작용이 관찰되지 않았음, A. fumigatus에 의한 전신감염에서의 두 약물의 길항작용, 이 시험에서 얻어진 결과의 임상적 유의성은 알려진 바 없습니다.
 - ▶ 항응고제 : 건강한 남자를 대상으로 한 약물상호작용시험에서 이 약은 와파린 투여 후 프로 트롬빈시간(12%)을 증가시켰습니다. 시험 후 조사검사에서 다른 이출제 약물과 마찬가지로 이 약과 와파린을 동시에 병용투여 시 프로트롬빈시간 연장으로 인한 출혈경향(역, 코피, 위 장관 출혈, 혈뇨, 혈변)이 보고 되었습니다. 쿠마린계 항응고제를 투여 받는 환자에서서 프로 트롬빈시간을 주의하여 모니터링 해야 합니다. 와파린의 용량조절이 필요할 수 있습니다.
 - ▶ 아지트로마이신 : 18명의 건강한 지원자를 대상으로 한 공개, 무작위, 3병항 교차시험에서 이 약(800mg 단회 경구투여)의 약동학을 대항 아지트로마이신(1200mg 단회 경구투여)의 영향 뿐 아니라 아지트로마이신의 약동학에 대한 이 약의 영향이 평가되었습니다. 이 약과 아지트로마이신 사이에 유의한 약동학적 상호작용은 없었습니다.
 - ▶ 벤조디아제핀계 약물(숙소성) : 미다졸람 투여 후, 이 약으로 인해 미다졸람의 농도와 정신운 동학적 효과가 상당히 증가하였습니다. 이러한 효과는 이 약의 주사제보다 경구제에서 더 두드러졌습니다. 이 약과 벤조디아제핀계 약물의 병용이 필요 시 벤조디아제핀계 약물의 경량을 고려해야 하며, 환자를 적절히 모니터링해야 합니다.
 - ▶ 이 약은 트리아졸람의 대사를 저해하기 때문에 트리아졸람(단회투여)의 AUC를 약 50% 증가 시키고 Cmax는 20~32%, 반감기는 25~50% 증가시킵니다. 트리아졸람의 용량조절이 필요할 수 있습니다.
 - ▶ 카르바마제핀 : 이 약은 카르바마제핀의 대사를 저해하며 카르바마제핀 혈청농도가 30% 증가됨이 관찰되었습니다. 카르바마제핀 독성이 발생할 위험이 있습니다. 농도 측정/효과에 따라 카르바마제핀의 용량조절이 필요할 수 있습니다.
 - ▶ 칼슘채널차단제 : 특정 디하이드로피리딘계 칼슘채널차단제(니페디핀, 이소라디핀, 알프로디핀, 베라파밀, 펠로디핀)은 CYP3A4에 의해 대사됩니다. 이 약은 칼슘채널차단제의 전신 노출 을 증가시킬 가능성이 있습니다. 이상반응에 대해 빈번한 모니터링이 권장됩니다.
 - ▶ 폐쇄곡식브 : 이 약(1일 200mg)과 폐쇄곡식브(200mg) 병용 치료 시, 폐쇄곡식브의 Cmax 와 AUC는 각각 68%, 134% 증가하였습니다. 이 약과 병용 시 폐쇄곡식브의 투여는 절반 용량으로 줄이는 것이 필요할 수 있습니다.
 - ▶ 사이클로스포린 : 이 약은 사이클로스포린의 AUC와 농도를 상당히 증가시킵니다. 사이클로 스포린 농도에 따라, 사이클로스포린 감량에 의해 이 약과 병용할 수 있습니다.
 - ▶ 시클로스포파미드 : 이 약과 시클로스포파미드의 병용요법 시 혈청 빌리루빈과 혈청 크레아 티닌의 증가가 나타났습니다. 혈청 빌리루빈 및 혈청 크레아티닌 상승의 위험성을 신중히 고려했을 때, 이 약과 병용할 수 있습니다.
 - ▶ 펜타닐 : 이 약과 펜타닐의 상호작용 가능성이 있는 치명적인 사례 한 건이 보고되었습니다. 이것은 펜타닐 중독으로 인한 사망으로 판단되었습니다. 더욱이 12명의 건강한 지원자를 대상으로 한 무작위, 교차시험에서 이 약이 펜타닐 제거(elimination)를 상당히 지연시켰음을 보였습니다. 펜타닐 농도 상승은 호흡 억제를 일으킬 수 있습니다.
 - ▶ 할로판트린 : 이 약은 CYP3A4에 대한 억제작용 때문에 할로판트린의 혈청농도를 증가시킬 수 있습니다.
 - ▶ HMG-CoA환원효소억제제 : 이 약을 CYP2C9에 의해 대사(예 : 플루바스타틴) 또는 CYP3A4 에 의해 대사(예 : 아토르바스타틴, 심바스타틴)되는 HMG-CoA 환원효소억제제와 병용투여 시 근육병증 및 횡문근용해의 위험성이 증가합니다. 병용요법이 필요할 경우 환자의 근육 병증 및 횡문근용해 증상을 관찰해야 하며, 크레아티닌 키나아제나 크레아틴인 키나아제의 농도를 모니터링 해야 합니다. 근육병증/횡문근용해가 진단, 의심되거나 크레아티닌 키나아제의 현저한 증가가 관찰된다면 HMG-CoA 환원효소억제제 투여를 중단해야 합니다.
 - ▶ 로자틴 : 이 약은 치료기간 동안, 로자틴이 인지오텐신수용제길항작용의 대부분을 담당하는 활성대사체(E~31 74)로 대사되는 것을 방해합니다. 환자들은 계속해서 혈압을 모니터링해야 합니다.
 - ▶ 메사틴 : 이 약은 메사틴의 혈청농도를 증가시킬 수 있습니다. 메사틴의 용량조절이 필요할 수 있습니다.
 - ▶ 비스테로이드성 항염증제제(NSAIDs) : 플루비프로펜 단독 투여에 비해 이 약과 병용투여 시 플루비프로펜의 Cmax와 AUC가 각각 23%, 81% 증가하였습니다. 이와 유사하게 라세미 이부프로펜(400mg)단독투여에 비해 이 약과 병용 시 약물학적 활성 이성체인 (S+)-이부 프로펜의 Cmax와 AUC가 각각 15%, 82% 증가하였습니다.

특복제 연구된 바는 없지만, 이 약은 CYP2C9에 의해 대사되는 다른 NSAIDs(예 : 나프록센, 로복시암, 밀록시암, 디클로페낙)의 전신 노출을 증가시킬 가능성이 있습니다. 이상반응과 NSAIDs관련 독성에 대해 빈번한 모니터링이 권장됩니다. NSAIDs의 용량조절이 필요할 수 있습니다.

▶ 경구용 피임제 : 다회용량 플루코나졸과 병용 시 피임제와 병용에 관해 두 가지의 약동학적 연구가 수행되었습니다. 이 약 1일 200mg 투여 시 ethinyl estradiol과 levonorgestrel 의 AUC가 각각 40%, 24% 증가한 반면, 이 약 50mg을 투여한 연구에 있어서는 호르몬 수치에 관련된 영향을 끼치지 않았습니다. 따라서 위의 용량과 같은 다회용량의 플루코나졸을 투여는 경구용 피임제의 효능에 영향을 미치지 않는 것으로 보인다.

▶ 페니토인 : 이 약은 페니토인의 간대사를 저해합니다. 이 약과 병용투여 시 페니토인 독성을 피하기 위해 페니토인의 혈청농도를 모니터링 해야 합니다.

○ 고령자
신기능이 정상인 경우에는 보통 성인 용량을 투여하며, 신장장애가 있을 때에는(크레아티닌 청소 율 40mL/min이하)투여용량을 줄이거나 투여간격을 늘려야 합니다.

○ 신장애 환자

이 약은 변화되지 않은 채 주로 소변을 통해 배설됩니다.

한편만 투여하는 경우에는 용량조절이 필요없으나, 여러번 투여해야 하는 경우에는 투여 첫날에만 상용량을 투여하고, 다음날부터는 다음과 같이 용량을 조절해야 합니다.

크레아티닌 청소율(mL/min)	권장되는 투여용량
>50	상용량의 100%
<50(투석하지 않음)	상용량의 50%
정기적인 투석환자	각 투석 후에 상용량의 100%

정기적인 투석을 받는 환자의 경우 각 투석 후에 상용량의 100%를 투여해야 합니다. 투석을 하지 않는 날에는 크레아티닌 청소율에 따라 감량하여 투여해야 합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약 및 다른 부형제, 다른 이출제 약물에 과민반응의 병력이 있는 환자

2) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

3) 다음의 약을 투여받고 있는 환자 :

▶ 다회용량상호작용시험결과에 근거하여, 이 약을 1일 당 400mg 또는 그 이상 용량을 반복 투여 받고 있는 환자에게 테르페나딘과의 병용

▶ QT 간격 연장 시키는 약물 및 CYP3A4에 의해 대사되는 시사프라이드, 아스테미졸, 에리트로마이신, 피모짓, 퀴나딘과의 병용

▶ 에르고타민, 디하드로에르고타민

4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다. (유당 함유 제제에 한함)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 약물과민반응의 병력이 있는 환자

2) 신장애 환자

3) 간장애 환자(간기능이 악화될 수 있습니다.)

4) 심장질환 또는 전해질이상 등 부정맥의 가능성이 있는 환자(torsades de pointes를 포함한 심실빈맥, QT연장, 심실세동, 발실차단, 서맥 등이 나타날 수 있습니다.)

5) 다음 약제를 투여 받고 있는 환자 :

▶ 이 약과 1일 400mg 미만 용량의 테르페나딘 병용투여 받는 환자는 신중히 모니터링 되어야 합니다.

▶ 할로판트린

6) 이 약은 강력한 CYP2C9억제제 및 중등도의 CYP3A4억제제입니다. 따라서 CYP2C9과 CYP3A4를 통해서 대사되는 좁은 치료영역을 가진 약물과 병용 시 환자들을 모니터링 해야 합니다.

3. 이상반응

이 약은 일반적으로 내약성이 좋습니다.

이 약과 대조약물을 투여하는 임상시험 동안, 특히 AIDS, 암과 같이 중대한 기저 질환을 가진 일부 환자들에게서 신장 및 혈액학적 기능시험 결과변화와 간장애가 관찰되었으나, 임상적 유의성과 치료와의 인과관계는 확실하지 않습니다.

이 약의 치료기간 동안 아래와 같은 빈도로 다음과 같은 이상반응이 관찰 및 보고되었습니다. : 매우 흔하게 보고된(≥1/10), 흔하게 보고된(≥1/100 ~ <1/10), 흔하지 않게 보고된(≥1/1000 ~ ≤1/100), 드물게 보고된(≥1/10000~≤1/1000), 매우 드물게 보고된(≤1/10000)

신체계	빈도	이상반응
혈액 및 림프계 이상	드물게	무과립구증, 백혈구감소증, 호중구감소증, 저혈소판증
면역계 이상	드물게	아나필락시스, 혈관부종
대사 및 영양계 이상	드물게	고중성지방혈증, 고콜레스테롤혈증, 저칼륨혈증
정신계 이상	흔하지 않게	불면증, 졸림
	흔하게	두통
신경계 이상	흔하지 않게	발작, 현기증, 감각이상, 미각이상
	드물게	말림
청각 및 미로 이상	흔하지 않게	어지럼
심장계 이상	드물게	torsade de pointes, QT연장
위장관계 이상	흔하게	복통, 설사, 오심, 구토
	흔하지 않게	소화불량, 고창, 입만건조
	흔하게	ALT(Alanine aminotransferase) 증가, AST(Aspartate aminotransferase) 증가, 혈중alkaline phosphatase 증가
간·담도계 이상	흔하지 않게	담즙돌체, 황달, 빌리루빈 증가
	드물게	간독성(드물게 치명적 경우 포함), bilirubin 간세포괴사, 간염, 간세포손상
	흔하게	발진
피부 및 피하조직 이상	흔하지 않게	가려움, 두드러기, 발진,발진가, 약물발진
	드물게	중독성 표피 괴사증후, 스티븐스-존슨 증후군, 급성 병발성 발진성 농포증, 탈락피부염, 열알부증, 탈모
근골격계, 결합조직 및 뼈이상	흔하지 않게	근육통
전신 이상 및 투여 부위 상태	흔하지 않게	피로, 권태, 무력증, 발열

소아환자

소아임상시험에서 기록된 이상반응 및 실험실검사수치 이상(laboratory abnormalities)의 패턴과 빈도는 성인에게서 보여 진 바와 유사합니다.

4. 일반적 주의

- 특히 AIDS나 암과 같은 중증 기저질환이 있는 일부 환자에서 이 약의 투여기간 중 혈액학, 간장, 신장, 그 외 생화학적 기능검사에서 이상이 관찰되었으나 그 임상적인 중요성과 이 약과 의 관련성에 대해서는 확인되지 않았습니다.
- 매우 드물게 이 약을 수차례 복용한 적이 있는 중증 기저질환을 가진 환자의 부검에서 간괴사 가 관찰되었습니다. 이들 환자들은 간괴사를 유발할 수 있는 질환을 가지고 있었거나 간독성을 유발할 수 있는 잠재적인 가능성을 가진 여러 약들을 병용하고 있었지만 이 약과의 관련성도 배제할 수 없으므로, 치료 중 이들 환자의 간효소가 의미있게 증가할 경우에는 이 약 투여에 따른 위험성과 유익성을 잘 평가하여 합니다.
- AIDS 환자는 많은 약물에서 중증 피부반응을 일으키기 쉽습니다. 이 약과 심한 표피박탈형 관련이 있다고 알려진 다른 약물을 복합 투여한 결과 소수의 AIDS 환자에서 그러한 피부반응 의 증가가 확인되었습니다.
- 신장애 환자에게 투여할 경우 투여 전에 크레아티닌 청소율을 측정하여, 투여량과 투여간격을 조절하는 등 주의합니다.
- 이 약 투여 전에 혈액검사, 신기능검사, 간기능검사, 혈중 전해질검사 등을 실시하는 것을 권장합니다.

▶ 프레드니솔론 : 프레드니솔론을 투여 받던 간이식 환자에서서 이 약을 3개월간 치료 후 중단 시, 급성 부신피질 기능저하가 발생했다는 사례가 보고되었습니다. 이 약의 중단에 의해 CYP3A4의 활성상성이 야기되어 프레드니솔론의 대사가 증가되었기 때문일 것으로 예측됩니 다. 이 약과 프레드니솔론을 장기간 투여 받은 환자는 이 약의 중단 시 부신피질 기능 저하에 대해 신중히 모니터링 되어야 합니다.

▶ 리파루틴 : 이 약과 리파루틴 병용 시 리파루틴의 혈청 농도가 80%까지 증가한다는 상호작 용 보고가 있었습니다. 이 약과 리파루틴을 병용한 환자에서서 포도당염이 보고되었습니다. 이 약과 리파루틴을 병용 시 환자를 신중히 모니터링 해야 합니다.

▶ 사쿠나비르 : 이 약은 P-glycoprotein 저해 및 CYP3A4에 의한 사쿠나비르 간대사 저해에 의해 사쿠나비르의 AUC와 Cmax를 각각 약 50%, 약 55% 증가시키며 사쿠나비르의 청소 율을 약 50% 감소시킵니다. 사쿠나비르의 용량조절이 필요할 수 있습니다.

▶ 시롤리무스 : 이 약은 아마도 CYP3A4와 P-glycoprotein을 통한 시롤리무스의 대사를 저해 하므로서 시롤리무스의 혈청농도를 증가시킵니다. 혈과/농도 측정에 따른 시롤리무스의 용량 조절을 고려하여 이 약과 병용할 수 있습니다.

▶ 설폰닐요소계 : 건강한 지원자에 대해 이 약과 병용투여 시 설폰닐요소계 약물(예 : 클로프 르파미드, 글리벤클라미드, 글리피지, 톨부타미드)의 혈청반감기 연장을 보였습니다. 이 약과 설폰닐요소계 약물 병용투여기간 동안 혈당에 대한 빈번한 모니터링과 설폰닐요소계 약물의 적절한 감량이 권장됩니다.

▶ 타크롤리무스 : 이 약은 정제서 CYP3A4에 의한 타크롤리무스의 대사를 저해시킴으로서 경구 투여된 타크롤리무스의 혈청농도를 5배까지 증가시킵니다. 타크롤리무스를 정맥 내로 투여했을 때에는 유의한 약동학적 변화가 관찰되지 않았습니다. 증가된 타크롤리무스의 농도 는 신독성과 연관이 있습니다. 타크롤리무스의 농도에 따라 경구로 투여되는 타크롤리무스의 용량을 감소시켜야 합니다.

▶ 데오필린 : 위약 대조 상호작용 시험에서 이 약 200mg을 14일 동안 투여 시 데오필린의 평균혈청농도가 18% 감소하였습니다. 고용량의 데오필린을 투여 받거나 데오필린 독성 발생 위험이 증가된 환자들은 이 약을 투여 하는 동안 데오필린독성의 징후를 관찰해야 하며, 만약 독성 징후가 나타날 시에 치료방법은 적절히 수정되어야 합니다.

▶ Vinca알칼로이드계 약물 : 연구된 바가 없으나, 이 약의 CYP3A4억제 가능성에 기인하여 이 약은 vinca 알칼로이드계 약물(예 : 빈크리스틴, 빈블라스틴)의 혈청농도 상승과 신독성 을 일으킬 수 있습니다.

▶ 비타민 A : 이 약과 모든 trans-retinoic acid (비타민 A의 산성형)의 병용투여를 받는 환자들로부터 보고된 사례에 따르면 중추신경계(CNS)와 관련해 의도하지 않았던 이상반응 으로서 가성 뇌종양이 나타났으며, 그것은 이 약의 치료 중단 후에 사라졌습니다. 이 약과의 병용이 중추신경계 관련 이상반응이 있음을 명심하십시오.

▶ 지도부딘 : 이 약이 광원 지도부딘의 청소율을 약 45% 감소시킴에 따라 지도부딘의 Cmax와 AUC를 각각 84%, 74% 증가시킵니다. 지도부딘의 반감기는 이 약과의 병용 후에 약 128%까지 연장됩니다. 이 약과 지도부딘을 병용투여 받는 환자들은 지도부딘 관련 이상 반응 발생에 대해 모니터링되어야 합니다. 지도부딘의 감량이 고려될 수 있습니다.

▶ 내인성스테로이드 : 이 약 1일 50mg 투여는 여성의 내인성 스테로이드 농도에 영향을 주지 않았습니다. 1일 200mg 투여는 건강한 남성 지원자의 부신피질 자극 호르몬 자극 반응이나 내인성 스테로이드 농도에 영향을 주