

# 엘카르틸 정

(아세틸-L-카르니틴염산염)

뇌기능 개선제

L-CARTIL Tablets

- 원료약품 및 분량 : 1정 중  
아세틸-L-카르니틴염산염(KP)-----590mg  
(아세틸-L-카르니틴염으로서 500mg)
- 성 상  
흰색의 장방형 제표정
- 효능·효과  
일차적 퇴행성 질환 또는 뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환
- 용법·용량  
아세틸-L-카르니틴으로서 1회 500 mg을 1일 2~3회 경구투여한다.
- 사용상의 주의사항
  1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.  
이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자
  2. 이상반응  
이 약의 복용 시 드물게 흥분작용이 나타나는 경우가 있으나 체내의 약물량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 소실된다.
  3. 상호작용  
다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있다.
  4. 임부 및 수유부 등에 대한 투여  
동물실험에서의 태아독성은 보고된 적이 없지만 임신 초기 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우에만 의사와 감독하에서 복용할 것.
- ※ 국내임상시험결과 추가 제출.
- 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
- 사용기간 : 제조일로부터 24개월
- 포장단위 : 60정
- 제 조 자 : 구주제약(주), 경기도 화성시 정남면 덕절제기길 5
- 제조의뢰자 : (주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18

\* 함습성이 강하므로 복용시에 개봉하십시오.

- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.
- ※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일(2015년 04월 27일)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)이나 소비자상담실 (080-611-8690 수신자부담)로 문의하시어 확인하실 수 있습니다.



제조의뢰 및 발매원

(주)동구바이오제약

본사 : 서울특별시 구로구 고척로 222  
공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18  
[www.dongkoo.com](http://www.dongkoo.com)