

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
- 1) 이 약에 과민증 환자 2) 중증의 간 및 신기능 장애 환자 3) 중증의 만성 심장 질환 환자 4) 진노 형성을 수반하는 배뇨장애 환자 5) 고혈압 환자 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부 7) 2세 이하의 영아 8) MAO 저해제를 투여중인 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 천식 환자 2) 녹내장 환자 3) 고혈압 및 관상동맥질환 환자 4) 심질환 및 부정맥 환자 5) 당뇨병, 감상신기능항진증 환자 6) 전립선비대로 인한 배뇨곤란 환자 7) 7세 이하의 소아
 3. 부작용
 - 1) 중추신경계 : 진정, 졸음, 중추 신경 쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한, 경미한 혈압강하, 시력장애, 산동, 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직, 아테토시스, 긴대상 및 강직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비가 나타날 수 있다.
 - 2) 과민증 : 피부반응, 일시적인 자각통, 작열감이 나타날 수 있다.
 - 3) 소화기계 : 구갈, 구역, 구토가 나타날 수 있다.
 - 4) 비뇨기 : 배뇨곤란이 나타날 수 있다.
 - 5) 소아에서 특히 흥분이 나타날 수 있다.
 4. 일반적 주의
 - 1) 이 약의 투여중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 주의한다.
 - 2) 7일 이내에 중증의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 연용전에 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 7세 이하의 소아에게는 필요한 경우 시럽제를 복용하되 용법·용량을 잘 지키고 표시된 연령 이외의 소아에게는 투여하지 않는다.
 5. 상호작용
 - 1) 혈압강하제, 알코올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO저해제, 교감신경흥분제, 삼환계 항우울제, 구아네틴, 브레틸리움 베타나이드, 데브리소퀸, 메칠도파, 교감신경성/중추성제, 식욕 억제제, 암페타민류의 신경자극제, α 및 β 이드레날린 저해제와 병용투여하지 않는다. MAO저해제 투여 최소 15일후 이 약을 투여한다.
 6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 안전성이 확립되지 않았으므로 투여하지 않는다.
 - 2) 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는다.
 7. 소아에 대한 투여
 - 1) 소아에서 특히 부작용이 크게 나타날 수 있으므로 주의한다.
 8. 과량투여시의 조치
 - 1) 과량투여시 급성 중독(환각 및 경련, 신경과민, 어지러움, 불면증 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 팽창 카테터 삽입법을 사용한다. 슈도에페드린 제거에는 투석하도록 한다.
 9. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

- 【포장단위】 자사 포장 단위
- 개발일자 2003. 12. 30
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
 - 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사(054)552-5381로 문의하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

염산트리페리딘(USP).....2.5mg
 염산수도에페드린(USP).....60mg

[성 상] 백색의 원형 정제

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[효능·효과] 코감기, 알레르기성 및 혈관운동성 비염에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물

[용법·용량] 성인 : 1회 1정

소아(8~14세) : 1회 1/2정
 1일 3회 식후에 복용한다.

알레르기성 비염 전문치료제

트리페린 정

일반의약품



중근당

개발회사

Kyongbo Pharm

10정