

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중
아이비업70%에탄올유동엑스(생규) 2g
(헤데라코시드C로서 40 mg)
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 80mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필 20mg

【성상】 황갈색 과일향의 시럽제

【효능·효과】 만성 염증성 기관지 질환의 증상 개선, 기침을 동반한 호흡기의 급성 염증 완화

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1). 이 약 및 이 약의 구성 성분에 과민반응 환자 2) 과당불내성 환자(감미제로 소르비톨 또는 과당 성분을 함유하고 있음.) 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임부예의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.) 4) 수유부(수유부예의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.) 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. 이 약은 카라멜 색소를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다. 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 위염 또는 위궤양 환자 2) 2세 미만의 영·유아(의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 합니다. 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다. 3) 코데인 또는 메스트로메트로판 등 다른 진해거담제가 함유된 제제와 병용 투여시 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시가능한 이 첨부문서를 소지하십시오 바랍니다. 이 이상반응 발현빈도는 드물게(0.01%~(0.1%), 매우 드물게(0.01% 미만)로 구분되었습니다. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1) 소화기계: 드물게 설사, 구역 혹은 구토가 나타날 수 있습니다. (2) 피부: 매우 드물게 켜게부종, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 두드러기가 나타날 수 있습니다. (3) 호흡기계: 매우 드물게 호흡곤란이 나타날 수 있습니다. (4) 기타: 발열, 고름가래가 나타날 수 있습니다. (5) 시판 후 조사 결과: ① 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 651명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 이상반응의 발현 빈도율은 0.46%(3례/651례)였으며, 보통 2건, 복부팽만감, 구역, 구토, 어지러움이 각 1건씩 보고되었습니다. ② 외국에서 실시된 9,657명의 시판후 조사 결과 아이비업 제제와 항생제/화학적제제 병용시 이상반응이 발현 빈도율이 26%, 항생제 이외의 약제와 병용시 아이비업 단독 사용에 비해 이상반응 발현 빈도율이 2배로 나타나 상대적으로 이상반응 위험이 증가된다는 보고가있다. 시판 후 조사 결과

Bronkid Syrup

어린이 기침약

브론키드

시럽

(아이비업70%에탄올유동엑스)



500mL



일반의약품 분류번호 : 222

KGMP 적격업체제품

과 이상반응은 주로 소화기계 이상으로, 경증(가벼운 증상)이었으며 일시적이었다. 이상반응으로 인해 46명(0.5%)이 치료를 중단하였으며, 이상반응은 주로 소화기계(100명 설사)에 의한 것이었습니다. 2) 1주일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜야 합니다. 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시켜야 합니다. 또한, 이상반응의 발현(드러냄)빈도와 발현(드러냄)부위에 대한 조사가 없었으므로 10세 미만 어린이가 복용할 경우 주의 깊게 모니터링해야 합니다. 6. 저장상의 주의사항 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오 (사용 후 반드시 밀폐 보관하십시오). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【용법·용량】 · 성인 및 15세 이상 : 아이비업70%에탄올유동엑스로서 1회 100 mg를 1일 3회 복용한다.

4~14세 : 이 약으로서 1회 100mg를 1일 2회 복용한다.

2~3세 : 이 약으로서 1회 50mg를 1일 3회 복용한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(~30°C)보관 **【포장단위】** 500mL

❖ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) → 의약품 검색을 참조하시기 바랍니다.

❖ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염 되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

❖ 대표전화 : (02) 2672-1122 제품문의 : 080-655-1414

홈페이지 : www.gujup.co.kr

❖ 제조자 : 한국플마(주) 세종특별자치시 천의면 산단길 245

❖ 제조회자 : 구주제약(주) 경기도 화성시 정남면 덕철제길 5
문안 최종 개정연월일 : 2015. 1. 20

(L-1501)

제조번호 :

사용기한 :

