

코감기 · 비염 노플정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

수도에페드린염산염(USP) 60mg

트리프로리딘염산염수화물(USP) 2.5mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물<기원 : 소, 사용부위 : 우유>

[성상] 백색의 원형정제

[효능 · 효과]

코감기, 알레르기성 및 혈관운동성 비염(코염)에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물

[용법 · 용량]

성인 : 1회 1정, 소아(8~14세) : 1회 1/2정 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 중증(심한 증상)의 간 및 신기능 장애 환자
- 3) 중증(심한 증상)의 관상 심장 질환 환자
- 4) 잔뇨(소변을 누고난 후에도 다 눈 것 같지 않은 느낌)형성을 수반하는 배뇨장애 환자
- 5) 고혈압 환자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 2세 이하의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 8) MAO 저해제(억제제)를 투여중인 환자
- 9) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 천식 환자
- 2) 녹내장 환자
- 3) 고혈압 및 관상동맥(심장동맥)질환 환자
- 4) 심질환 및 부정맥 환자
- 5) 당뇨병, 갑상선기능항진증 환자
- 6) 전립선(전립샘)비대로 인한 배뇨곤란 환자
- 7) 7세 이하의 소아