

효과 빠른 코감기약

스노콜 정



연속적인 재채기 발작, 계속 흘러내리는 맑은 콧물(수양성 비루), 코막힘(비폐색)은 코점막이 어떤 특정물질에 대한 알레르기 반응으로 인해 나타나는 알레르기성 비염의 주증상입니다. 이는 콧속 점막에서 항원(알레르기 원인물질)에 대한 항체(체내 면역글로불린)의 과민반응에 의해 비염이 발생하는 경우입니다. 그 외 눈이나 목안이 가렵고 눈물이 나고 눈이 부시거나 머리가 아프며 냄새 맡기가 힘들어지거나 피로를 느끼게 되는 경우도 있습니다. 알레르기성 비염이 치료되지 않은 채로 오래되면 코는 항상 막혀있게 되어 부비동염(축농증)이나 중이염으로 발전할 수 있습니다. 스노콜정은 우수한 항히스타민작용과 항콜린작용을 통해 콧물, 눈물의 과도한 분비 및 코막힘을 개선하고 재채기 등의 증상을 효과적으로 완화시켜 주는 제제입니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정(200mg) 중
클로르페니라민말레산염(KP) 4mg
페닐레프린염산염(KP) 10mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원 : 소, 사용부위 : 우유)

[성상] 백색의 원형정제

[효능·효과]

- 감기 또는 알레르기성 및 혈관운동성 비염(코염)에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물
- 부비동염에 의한 비축혈(코막힘)의 일시적 완화

[용법·용량]

- 성인(만12세 이상) : 4시간마다 1정씩 복용하되, 24시간 동안 6정을 초과하지 않거나, 의사의 지시에 따른다.
- 만6~12세 소아 : 4시간마다 1/2정씩 복용하되, 24시간 동안 3정을 초과하지 않거나, 의사의 지시에 따른다.
- 만6세 이하 소아 : 의사의 지시에 따른다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것

- 1) 아민계 교감신경항진제, 항히스타민제, 기타 이 약의 성분에 과민성인 환자
- 2) 특이체질환자
- 3) 수유부
- 4) 중증(심한 증상)의 고혈압환자, 중증(심한 증상)의 관상동맥질환환자, MAO저해제(억제제) 치료를 받고 있는 자
- 5) 협우각성 녹내장, 뇨저류(소변이 고임), 소화성궤양, 천식, 폐기종, 만성폐질환, 숨이 차거나, 호흡곤란이 있는 환자
- 6) 진정제, 신경안정제를 투여 받고 있는 환자
- 7) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음의 경우에는 신중히 투여할 것

만성기관지염 등의 호흡곤란, 심질환, 고혈압, 갑상선기능질환, 당뇨병, 녹내장, 전립선(전립샘) 비대로 인한 배뇨(소변을 누)곤란을 가진 환자는 의사의 지시가 없는 한 복용하지 말 것

3. 이상반응

- 1) 교감신경아민을 포함한 약제는 다음과 같은 이상반응이 나타날 수 있다. : 공포, 불안, 긴장, 진전(떨림), 쇠약, 창백, 호흡곤란, 배뇨(소변을 누)곤란, 불면, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 어지러움, 저혈압을 동반한 심혈관허탈
- 2) 페닐레프린에 과민인 사람은 빈맥(빠른 맥), 동계(두근거림), 두통, 어지러움, 오심(구역) 등의 에페드린양 반응이 나타날 수 있다. 그러나 페닐레프린을 적량 투여하면 이런 이상반응이 나타나지 않는 안전한 약물이다.
- 3) 항히스타민제에 과민인 사람은 중증도의 진정작용을 나타낼 수 있다.
- 4) 항히스타민제로 인한 다른 이상반응은 구갈(목마름), 어지러움, 쇠약, 식욕부진, 오심(구역), 구토, 두통, 신경과민, 다뇨(소변량 과다)증, 가슴앓이, 복시(겉보임), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있고 드물게 피부염이 나타날 수 있다.
- 5) 졸음을 일으킬 수 있으며, 알코올, 진정제, 신경안정제 등의 졸음을 증가시킬 수 있다.
- 6) 어린이에게는 특히 흥분이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나, 고열을 동반할 때는 의사와 상의할 것
- 2) 이 약의 복용중에는 알코올성음료를 피한다.
- 3) 이 약의 복용중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 할 것
- 4) 용량을 초과하지 않도록 하고, 사고로 과량 복용시에는 의사와 상의한다.
- 5) 이 약의 복용에 의해 어지러움, 불면, 신경과민 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사와 상의할 것

5. 보관 및 취급상의 주의

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

[저장방법] 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 자사포장단위

[날알모음포장(PTP)의 제조번호 사용기한 보는 법]

예를 들어 "1101 20140101"로 표기된 경우, 앞 네자리 "1101"은 제조번호, 뒤 여덟자리 "20140101"은 사용기한 "2014년 01월 01일"을 각각 의미함.

※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변태 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거, 구입하신 약국에서 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자 상담실(☎080-001-0795) 또는 식약청 이드러그(ezdrug.kda.go.kr)사이트의 의약품 정보란에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2011년 04월 20일

제조사 :



판매자 :

