

이담소화제

아베날 정

(알리벤돌)

Abenal Tab.

■ 성분·함량 : 1정 중

알리벤돌(KPC) 100mg

식약청인정 타르색소(황색 4호, 청색 1호)

■ 성상 : 녹색의 장방형 필름코팅정제

■ 효능·효과

· 주효능 효과
소화불량, 구역, 구토, 변비 등의 증상치료

■ 용법·용량

성인 : 알리벤돌로서 1일 300~400mg을 3~4회 분할하여 식전 및 취침시 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 일반적 주의
1) 다음 경우에는 신중히 투여할 것 황색 4호(타르트라진)에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자(이 약은 이 성분을 함유하고 있음)
2) 다른 약물을 투여하고 있는 경우에는 투여하기 전에 약사 또는 의사와 상의한다.
3) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
3. 소아에 대한 투여
이 약은 7세 미만의 영, 유아에게 경구투여하지 않는다.
4. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 30정, 100정

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 구입한 약국이나 담당영업소에서 교환하여 드립니다.

"이 첨부문서 개정일(09년 11월)이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr 나 02-576-6121,3에서 확인할 수 있으며, 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드락(ezdrug.kfda.go.kr)의약품 정보를 참조하시기 바랍니다."



제조·판매원

경동제약주식회사

공장 : 경기도 화성시 양감면 대왕리 535-3
소비자상담실 전화번호 : (02)576-6121,3

· 작성년월 : 2004. 03

· 개정년월 : 2009. 11

개정번호 : 0910S