

※ 복용 전에 사용설명서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.



비만은 소비되는 열량보다 섭취하는 열량이 많은 경우 남는 열량이 우리 몸에 지방으로 축적되어 나타나며 대부분 음식물의 과다섭취나 운동부족 등으로 유발됩니다. 따라서 과도하게 살이 찐 경우는 물론 체중은 정상이다 하더라도 체지방률이 높으면 비만이라 할 수 있습니다. 비만은 만성적이고 재발하기 쉬운 질환이며 전 세계 수백만 인구에게 영향을 주고 있으며 비만에 걸린 사람은 고혈압, 고지혈증, 당뇨 등 성인병 발병 위험이 정상 체중자에 비하여 훨씬 높다고 할 수 있습니다.

리드미 캡슐의 주성분인 그린티엑스는 우리 몸에 과도하게 축적된 체지방 분해를 촉진하고 지방의 흡수를 억제하는 체중감소제로서 이미 프랑스 등에서 임상시험 등을 통하여 효과가 입증된 생약성분의 안전한 체중감소 보조요법제입니다.

■ 원료약품의 분량 : 1캡슐 중
그린티엑스(별규).....375mg
첨가제(타르크소) : 청색1호, 황색203호, 녹색3호

■ 성 상 : 연갈색의 분말이 충전된 상부 녹색, 하부 암녹색의 캡슐제

■ 효능·효과 : 비만 또는 과체중시 체중감소를 위한 보조요법

■ 약리작용 및 특징

1. 리드미 캡슐은 이미 체중감소효과가 입증된 그린티를 세계적인 생약연구 및 원료 제조회사인 스위스에서 일정한 규격으로 추출, 가공하여 만든 그린티-엑스를 주원료로 하여 제조한 것입니다.
2. 리드미 캡슐은 열생성량을 증가시켜 우리 몸에 축적된 지방의 분해를 촉진하고 지방분해 효소인 리파제의 작용을 억제하여 지방의 흡수를 억제하는 이중작용으로 체중감소효과를 나타냅니다.
3. 리드미 캡슐은 BMI 지수 25이상인 중등도이상의 비만치료에 효과적인 한국인에게 적합한 체중감소보조요법제 입니다.

■ 용법·용량

12세이상 소아 및 성인
아침식사 중 2캡슐, 점심식사 중 2캡슐을 다량의 물과 함께 복용 하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 일반적 주의
이 약은 녹차에서 추출된 카페인을 함유하고 있어 운동선수의 경우 도핑테스트에서 양성반응을 나타낼 수 있으므로 주의하십시오.
2. 임부에 대한 투여
동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
3. 저장상의 주의사항 : 30℃ 이하의 건조한 곳에 보관하십시오.
4. 기타
 - 1) 1999~2002년까지 프랑스 및 스페인에서 실시된 모니터링 결과, 총 13건(프랑스 9건, 스페인 4건)의 이상반응이 보고되었으며 모두 간독성 관련 이상반응으로 간염 12건 황달 1건이 보고되었다. 대부분 투여중지 후 2개월 이내에 회복되었으나 간이식을 받아야 하는 경우도 1건 보고되었습니다.
 - 2) 동 제제에 대한 안전성(간독성)자료 및 사용성적조사 자료 검토 결과는 다음과 같습니다.
 - (1) 설치류 6개월 반복투여독성시험 결과, 간장효소의 이상치는 대조군과 통계적으로 유의한 차이가 없었으며, 간장의 조직병리학적 이상병변은 대조군을 포함한 모든 군에서 발생하여 약물과의 인과관계를 판단하기 어려운 것으로 나타났습니다.
 - (2) 비설치류 9개월 반복투여독성시험자료 결과, 간장효소의 이상치는 대조군과 통계적으로 유의한 차이가 없었으며, 간장의 조직병리학적 이상병변은 관찰되지 않았습니다.
 - (3) 국내에서 '06.1.1~'07.12.31 동안 비만 및 과체중 환자 4,970명을 대상으로 한 사용성적조사 결과는 다음과 같습니다.
 - ① 유해사례는 0.81%(40명/4,961명)로 나타났으며, 위장관계 이상 0.32%(16례/4,961례)[소화불량증 0.14%, 구토 0.06%, 위장장애 0.06%, 구갈 0.04%, 구역 0.02%, 복부불쾌 0.02%], 간 및 담도계 이상 0.22%(11례/4,961례)[SGOT 상승 0.12%, SGPT 상승 0.10%, 간기능 이상 0.04%], 전신 이상 0.16%(8례/4,961례)[피로 0.12%, 무력 0.04%, 부종 0.02%], 정신신경계 이상 0.12%(6례/4,961례)[불면 0.12%], 중추 및 말초신경계 이상 0.08%(4례/4,961례)[현기증 0.06%, 감각저하(손발 및 얼굴) 0.02%]로 보고되었습니다.
 - ② 유해반응은 0.48%(24명/4,961명)로 보고되었으며, 위장관계 이상 0.30%(15례/4,961례)[소화불량증 0.14%, 위장장애 0.06%, 구토 0.04%, 구갈 0.04%, 구역 0.02%, 복부불쾌 0.02%], 간 및 담도계 이상 0.06%(3례/4,961례)[SGOT 증가 0.04%, SGPT 증가 0.02%, 간기능 이상 0.02%], 전신 이상 0.04%(2례/4,961례)[무력 0.04%], 정신신경계 이상 0.10%(5례/4,961례)[불면 0.10%], 중추 및 말초

신경계 이상 0.08%(4례/4,961례)[현기증 0.06%, 감각저하(손발 및 얼굴) 0.02%]로 나타났습니다. 이 중 간 및 담도계 관련 이상반응은 3례에서 4건으로 나타났으며, "불명" 2례, "관련 있을 가능성이 있음" 1례로 나타났습니다.

- ③ 간장에 환자에서 유해반응이 통계적으로 유의하게($P<0.0001$) 나타났으나, 정도는 경중이며 본제와 인과관계가 있는 간 및 담도계 이상은 나타나지 않은 것으로 보고되었습니다.

■ 포장단위 : 100캡슐, 500캡슐

■ 저장방법 : 차광기밀용기, 30℃ 이하 건조보관

- * 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품 정보」를 참조하십시오.

(이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.)

최종작성일자 : 2012. 05. 16



마음까지 건강하게
(주) 서울제약
경기도 시흥시 경제로 59
문의전화 : (080)780-1931