

고단위 복합소화제 **잘젠** 정

Zalzen Tab.

소화불량 / 과식 / 식체(체함) / 더부룩할 때

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

 디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000Ⅳ(KP) 20.0mg
 (전분당화력(pH4.5)278단위이상, 전분호정화력(pH4.5)640단위이상, 단백소화력(pH3.0)170단위이상,
 섬유소당화력(pH4.5)2단위이상)

리파제Ⅱ(KP) (지방소화력(pH6.0)120단위) 20.0mg

우르소데옥시콜산(KP) 10.0mg

시메티콘(KP) 30.0mg

- 첨가제(식약청인정타르색소) : 황색4호, 청색1호 / - 첨가제(동물유래성분) : 무수유당 (건강한 소의 우유)

【성 상】 녹색의 장방형 필름코팅정

【효능 · 효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(체함)(위체), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법 · 용량】 성인 1회 1~2정, 1일 3회 식후에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상당시 이 첨부 문서를 소지하십시오. 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【포장단위】 100정, 1000정 **【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

 ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drugmids.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.

※ 기타 자세한 사항이나 문서의 작성/개정일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-558-7575)로 문의하시기 바랍니다.

※ 부작용 보고 : 한국 의약품 안전관리원 (1644-6223)

문서작성(개정)일자 : 2015. 11. 27

【제조원】 C-TRI (주)씨트리

경기도 남양주시 경강로 27