

알콜성지방간, 간기능장애 보조치료제

헤파타인액

일반의약품

분류번호:391

Hepatine Liq.



※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

헤파타인액은 흡수가 빠른 알콜성지방간, 간기능장애 개선제입니다. 헤파타인액은 간의 해독기능을 개선시키고 체내 지방축적을 방지하여 간의 대사능력을 향상시켜 피로회복 및 집중력 향상에 도움을 주는 간세포보호 및 대사 촉진작용을 나타냅니다.

[원료약품 및 그 분량] 100 mL 중

L-아르기닌(USP)	7.31 g
시트르산수화물(KP)	2.94 g
베타인염산염(USP)	5.0 g
(베타인으로서 3.8135g)	
베타인(별규)	5.0 g
• 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸	5.0 mg
• 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필	5.0 mg

[성상] 갈색 바이알에 든 특이한 향이 있는 옅은 담갈색의 액체

[효능·효과] 간질환의 보조 치료

[용법·용량]

성인 : 1일 10~30 mL를 식간(식사때와 식사때 사이에) 분할 복용합니다.
이 약 10 mL를 약 반 컵의 물에 희석(물계 함)하여 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 신장환 환자, 심근경색 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 이 약은 알콜 중독시 해독제로 사용할 수 없습니다.
- 3) 심근경색 및 그 병력이 있는 환자

2. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킵니다.
- 2) 이 약은 내복제용으로만 사용하고 주사용으로 사용하지 마십시오.
- 3) 알콜성분이 함유되어 있음을 고려해야 합니다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용으로 이상반응이 나타나는 경우
- 2) 1개월 정도 복용하여도 개선이 없을 경우

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[포장단위] 20mL × 30바이알, 20mL × 30바이알 × 2

[저장방법] 차광밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

[제조/외재] (주)씨트리 경기도 남양주시 경강로27

[제조자] ㈜동구바이오제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-558-7575)로 문의하시기 바랍니다.

※ 부작용 보고 : 한국의약품 안전관리원 (1644-6223)

■ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질,변패 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약품을 통하여 교환하여 드립니다.

■ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

■ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.

■ 기타 자세한 사항이나 문서의 작성(개정)일자(2016. 10. 21) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-558-7575)로 문의하시기 바랍니다.

■ 부작용 보고 : 한국의약품 안전관리원 (1644-6223)

※마개 여는법



표시부분(▽)을 좌측 그림과 같이 위로 밀어 원천히 뒤로 젖힌후 그림과 같이 사계반대 방향으로 돌리후 고무 마개를 제거후 드십시오.

C-TRI (주)씨트리

본사 및 공장 : 경기도 남양주시 경강로27

고객 상담실 : 080-558-7575, www.c-tri.co.kr