

화인코프 에이TM 캡슐

화인코프 에이TM 캡슐은 기침을 완화시키는 진해제, 가래의 배출을 돕는 거담제(가래약) 및 소염 효소제, 콧물과 재채기를 완화시키는 항히스타민제 등 기침과 가래에 효과가 있는 성분들을 배합한 진해거담제(가래약)입니다. **화인코프 에이TM 캡슐**은 가벼운 기침감기를 비롯하여 가래기침, 오래되고 잘 가라앉지 않는 기침 등 각종 기침에 효과를 발휘합니다.

[원료약품의 분량]

덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	10mg
dl-메틸에페드린염산염(KP)	12.5mg
노스카핀염산염수화물(KP)	10mg
구아아콜설폰산칼륨(USP)	45mg
클로르페니라민말레인산염(KP)	2mg
첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호	

[성상]: 흰색의 분말이 들어 있는 상부 청색, 하부 유백색의 경질캡슐

[효능·효과]: 기침, 가래

[용법·용량]: 15세 이상의 성인 : 1회 2캡슐씩 1일 3회 식후에 복용한다.
8세 - 14세의 어린이 : 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.
다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멸미약, 알레르기용약), 진정제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.
 - 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 다음과 같은 기침이 있는 사람(호흡, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면
 - 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
 - 만 7세 이하의 영·유아에게는 시럽제를 복용시킬 것
 - 복용시에는 음주하지 말 것.
 - 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법]: 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위]: 10캡슐

※ 주의

- 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- 의약품을 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.
- 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
- PTP포장을 개봉하여 복용시 가끔 캡슐제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 캡슐제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.

※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2016년 05월 18일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

07016



제조판매원

삼진제약주식회사

본사 : 서울특별시 마포구 외우선로 121 (서교동)

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6